

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סאקסנדה®

תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש

חומר פעיל: לירגלוטייד 6 מ"ג/מ"ל liraglutide 6 mg/ml

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

סאקסנדה משמשת להורדה במשקל ביחד עם דיאטה ופעילות גופנית במבוגרים מגיל 18 ומעלה אשר:

- ה-BMI שלהם הוא 30 ק"ג/מטר² או יותר (השמנה) או
 - ה-BMI שלהם הוא מ-27 ל-30 ק"ג/מטר² (משקל עודף), הסובלים מבעיות בריאותיות הקשורות לעודף משקל (כגון סוכרת, יתר לחץ דם, רמות חריגות של שומנים בדם) ושנכשלו בעבר בתוכנית התערבותית להורדת משקל.
- BMI (מדד מסת הגוף) הוא מדד למשקל ביחס לגובה .

עליך להפסיק את השימוש בסאקסנדה לאחר 12 שבועות של טיפול במינון 3.0 מ"ג/יום אם לא הורדת לפחות 5% ממשקל הגוף הראשוני. התייעץ עם הרופא שלך לפני המשך הטיפול.

ניתן להשתמש בסאקסנדה בנוסף לתזונה בריאה ופעילות גופנית מוגברת לניהול משקל במתבגרים מגיל 12 ומעלה הסובלים מ:

- השמנה (מאובחן על-ידי רופא)
- משקל גופם מעל 60 ק"ג

עליך להמשיך ולהשתמש בסאקסנדה רק אם איבדת לפחות 4% מה-BMI אחרי 12 שבועות טיפול במינון 3.0 מ"ג/יום או המנה המקסימלית הנסבלת (ראה סעיף 3). התייעץ עם הרופא לפני שתמשיך.

קבוצה תרפויטית: תרופות לטיפול בסוכרת, אנלוגים לפפטיד דמוי גלוקגון-1 (GLP-1).

סאקסנדה היא תרופה להורדה במשקל המכילה את החומר הפעיל לירגלוטייד. היא דומה להורמון טבעי הנקרא פפטיד דמוי גלוקגון-1 (GLP-1) המשתחרר מהמעיים לאחר ארוחה. סאקסנדה פועלת על קולטנים במוח השולטים בתיאבון, וגורמת לך להרגיש תחושת מלאות ופחות רעב. השפעה זו עשויה לעזור לך לאכול פחות מזון ולרדת במשקל הגוף שלך.

דיאטה ופעילות גופנית

הרופא יקבע לך דיאטה ותוכנית אימונים. הקפד על תוכנית זאת כל עוד אתה משתמש בסאקסנדה.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) ללירגלוטייד או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (המפורטים בסעיף 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- לפני תחילת השימוש בסאקסנדה, שוחח עם הרופא שלך, הרוקח או האחות.
- השימוש בתרופה אינו מומלץ אם אתה סובל מאי ספיקת לב חמורה.
- קיים ניסיון מועט בשימוש בתרופה זאת במטופלים בני 75 ומעלה. התרופה אינה מומלצת אם אתה בגיל 75 או יותר.
- קיים ניסיון מועט בשימוש בתרופה זאת במטופלים הסובלים מבעיות בכליות. התייעץ עם הרופא אם אתה סובל ממחלת כליות או אם אתה מטופל בדיאליזה.
- קיים ניסיון מועט בשימוש בתרופה זאת במטופלים הסובלים מבעיות בכבד. התייעץ עם הרופא אם אתה סובל מבעיות בכבד.
- תרופה זו אינה מומלצת אם אתה סובל מבעיות חמורות בקיבה או במעי, הגורמות לעיכוב בהתרוקנות הקיבה (שיתוק קיבה המכונה גם גסטרופרזיס) או אם אתה סובל ממחלת מעי דלקתית.

אנשים עם סוכרת

אם אתה סוכרתי, אין להשתמש בסאקסנדה כתחליף לאינסולין.

דלקת בלבלב

שוחח עם הרופא שלך אם אתה סובל ממחלה בלבלב או אם סבלת ממחלה כזאת בעבר.

דלקת בכיס המרה ואבנים בכיס המרה

אם תרד במשקל במידה ניכרת, תהיה בסיכון להופעת אבנים בכיס המרה וכתוצאה מכך לדלקת בכיס המרה. הפסק את השימוש בסאקסנדה ופנה מיד לרופא אם אתה סובל מכאבים חריפים בבטן העליונה, לרוב כאבים מסוג זה חזקים במיוחד בצד ימין מתחת לצלעות. ייתכן שהכאב יקרין גם לגב או לכתף ימין. ראה סעיף 4.

מחלה בבלוטת התריס

התייעץ עם הרופא שלך אם אתה סובל ממחלה בבלוטת התריס, לרבות קשריות (גושים) בבלוטת התריס והגדלה של בלוטת התריס.

קצב לב

שוחח עם הרופא שלך אם יש לך דפיקות לב (פלפיטציות, מצב בו אתה מודע לפעימות הלב שלך) או אם אתה מרגיש שקצב הלב שלך מהיר בזמן מנוחה, במהלך הטיפול בסאקסנדה.

אובדן נוזלים והתייבשות

בתחילת הטיפול בסאקסנדה ייתכן שתאבד נוזלים או תתייבש. תופעות אלה עשויות לנבוע מבחילות, הקאות ושלשול. חשוב להימנע מהתייבשות על ידי שתיית כמויות גדולות של נוזלים. בכל שאלה או חשש שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות. ראה סעיף 4.

ילדים ומתבגרים

אין להשתמש בתרופה זו בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 12, מכיוון שהשפעות והבטיחות של התרופה לא נבדקו בקבוצת הגיל הזאת.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחורונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול בסוכרת הנקראות "סולפונילאוריאה" (כגון גלימפיריד או גליבנקלאמיד) או אם אתה לוקח אינסולין – אתה עלול לסבול מרמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה) בעת השימוש בתרופות אלה עם סאקסנדה. ייתכן שהרופא יתאים את המנה של תרופת הסוכרת שלך על מנת למנוע רמת סוכר נמוכה בדם. לסימני האזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם, ראה סעיף 4. אם אתה מתאים את מנת האינסולין שלך, הרופא עשוי להמליץ לך לנטר את הסוכר בדם לעיתים קרובות יותר.
- ווארפארין או תרופות אחרות הנלקחות דרך הפה לצורך הפחתת קרישת הדם שלך (נוגדי קרישה). ייתכן שתזדקק לבדיקות דם תכופות יותר לבחינת יכולת הקרישה של דמך.

היריון והנקה

אל תשתמשי בסאקסנדה אם את הרה, סבורה שיתכן שאת הרה או מתכננת להרות, מכיוון שלא ידוע אם סאקסנדה עלולה להשפיע על התינוק.
אל תניקי אם את משתמשת בסאקסנדה, מכיוון שלא ידוע אם סאקסנדה עוברת לחלב האם.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שסאקסנדה תשפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונות. חלק מהחולים עלולים לחוש סחרחורת בעת נטילת סאקסנדה, בעיקר בשלושת החודשים הראשונים לטיפול (ראה סעיף 'תופעות לוואי'). אם אתה מרגיש סחרחורת, היזהר במיוחד בעת נהיגה או שימוש במכונות. שוחח עם הרופא אם אתה זקוק למידע נוסף.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לכל מנה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

הרופא יקבע לך דיאטה ותוכנית אימונים. הקפד על התוכנית הזאת כל עוד אתה משתמש בסאקסנדה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים

הטיפול שלך יתחיל במנה נמוכה, שתלך ותגדל באופן הדרגתי במהלך חמשת השבועות הראשונים של הטיפול.

- כאשר תתחיל להשתמש לראשונה בסאקסנדה המנה ההתחלתית תהיה 0.6 מ"ג פעם ביום למשך שבוע אחד לפחות.
 - הרופא ינחה אותך להגדיל בהדרגה את המנה שלך, בדרך כלל ב-0.6 מ"ג בכל שבוע, עד שתגיע למנה המומלצת של 3.0 מ"ג פעם ביום.
- הרופא יאמר לך מהי מנת הסאקסנדה שעליך ליטול בכל שבוע. בדרך כלל, יאמר לך לפעול על פי הטבלה הבאה:

שבוע	המנה שיש להזריק
שבוע 1	0.6 מ"ג פעם ביום
שבוע 2	1.2 מ"ג פעם ביום
שבוע 3	1.8 מ"ג פעם ביום
שבוע 4	2.4 מ"ג פעם ביום
שבוע 5 והלאה	3.0 מ"ג פעם ביום

אחרי שתגיע בשבוע 5 למנה המומלצת של 3.0 מ"ג, המשך להשתמש במנה זו עד שתקופת הטיפול שלך תסתיים. אין להגדיל את המנה מעבר לכך.

הרופא יעריך את הטיפול שלך באופן סדיר.

מתבגרים (≤ 12 שנים)

עבור מתבגרים מגיל 12 ועד פחות מ-18 שנים ייושם אותו לוח זמנים של העלאת מינון כמו במבוגרים (ראה את הטבלה מעלה עבור מבוגרים). יש להגדיל את המנה עד 3.0 מ"ג (מנת אחזקה) או עד הגעה למנה המקסימלית הנסבלת. מנה יומית גבוהה מ-3.0 מ"ג אינה מומלצת.

אין לעבור על המנה המומלצת.

איך ומתי להשתמש בסאקסנדה

- לפני השימוש בעט בפעם הראשונה, הרופא או האחיות יראו לך כיצד להשתמש בעט.
- אתה רשאי להשתמש בסאקסנדה בכל שעה במהלך היום, עם או ללא מזון או משקה.
- השתמש בסאקסנדה בערך באותה השעה בכל יום – בחר את שעת היום הנוחה לך ביותר.

מקום ההזרקה

- סאקסנדה ניתנת בהזרקה מתחת לעור (זריקה תת-עורית).
- המקומות הטובים ביותר להזרקה הם החלק הקדמי של המותן (בטן), החלק הקדמי של הירך או החלק העליון של הזרוע.
- אין להזריק לתוך וריד או שריר.
- הוראות שימוש מפורטות מופיעות בסוף העלון לצרכן.

אנשים עם סוכרת

- דווח על כך לרופא אם אתה סוכרתי. ייתכן שהרופא יבצע התאמות מינון לתרופות שאתה מקבל לטיפול בסוכרת, על מנת למנוע רמת סוכר נמוכה בדם.
- אין לערבב סאקסנדה עם תרופות אחרות שאתה מזריק (לדוגמה אינסולין).
- אין להשתמש בסאקסנדה בשילוב עם תרופות אחרות המכילות אגוניסטים לקולטן GLP-1 (כגון אקסנטייד או ליקסיסנטייד).

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

- אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. ייתכן שתזדקק לטיפול רפואי. התופעות הבאות עלולות להתרחש:
- בחילה
- הקאות
- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה). אנא ראה סעיף 4 ("תופעות לוואי שכוחות") לסימני אזהרה של רמת סוכר נמוכה בדם.

אם שכחת ליטול את התרופה

- אם שכחת מנה ונזכרת בכך בתוך 12 שעות מהשעה שבה אתה בדרך כלל לוקח את המנה, הזרק את המנה ברגע שאתה נזכר.
- לעומת זאת, אם חלפו יותר מ-12 שעות מאז שהיית אמור להשתמש בסאקסנדה, דלג על המנה שהוחמזה והזרק את המנה הבאה שלך למחרת בשעה הרגילה.
- אין להשתמש במנה כפולה או להגדיל את המנה ביום שלמחרת על מנת לפצות על המנה שהוחמזה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
- גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אין להפסיק טיפול בסאקסנדה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסאקסנדה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי חמורות

במטופלים שהשתמשו בסאקסנדה, דווח לעיתים נדירות על תגובות אלרגיות חמורות (אנפילקסיס). **עליך לפנות מיד לרופא** אם מופיעים אצלך תסמינים כגון קשיי נשימה, נפיחות בפנים ובגרון וקצב לב מהיר.

במטופלים שהשתמשו בסאקסנדה היו דיווחים לא שכיחים על דלקת בלבלב (פנקראטיטיס). דלקת בלבלב היא מצב רפואי חמור העלול להיות מסכן חיים.

הפסק לקחת סאקסנדה ופנה מיד לרופא אם אתה מבחין באחת מתופעות הלוואי החמורות הבאות:

- כאבים חריפים ומתמשכים בבטן (באזור הקיבה) העלולים להקרין לגב, וכן בחילות והקאות, כי הם עלולים להיות סימן לדלקת בלבלב (פנקראטיטיס).

תופעות לוואי נוספות

שכיחות מאוד: עלולות להופיע אצל יותר מ-1 מתוך 10 משתמשים

- בחילה, הקאות, שלשול, עצירות, כאב ראש – אלה בדרך כלל נעלמים תוך כמה ימים או שבועות.

שכיחות: עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 10 משתמשים

- בעיות המשפיעות על הקיבה והמעיים, כגון: קשיי עיכול (דיספפסיה), דלקת בדופן הקיבה (גסטריטיס), אי נוחות בקיבה, כאב באזור העליון של הקיבה, צרבת, הרגשת נפיחות, גזים, גיהוקים ופה יבש
- חולשה או עייפות
- שינויים בחוש הטעם
- סחרחורת
- נדודי שינה (אינסומניה). מתרחשים בדרך כלל במהלך שלושת החודשים הראשונים של הטיפול
- אבנים בכיס המרה
- תגובות במקום ההזרקה (כגון חבורות, כאב, גירוי, גרד ופריחה)
- רמת סוכר נמוכה בדם (היפוגליקמיה). סימני האזהרה לרמת סוכר נמוכה בדם עלולים להופיע בפתאומיות ויכולים לכלול: זיעה קרה, עור קר וחיוור, כאב ראש, דופק מהיר, בחילה, תחושת רעב מופרזת, שינויים בראייה, ישנוניות, חולשה, עצבנות, חרדה, בלבול, קשיים בריכוז ורעד. הרופא יאמר לך איך לטפל ברמת סוכר נמוכה בדם ומה לעשות אם אתה מבחין בסימני האזהרה האלה.
- עלייה באנזימי הבלבלב, כגון ליפאז ועמילאז.

לא שכיחות: עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 100 משתמשים

- איבוד נוזלים (התייבשות). סביר יותר שיקרה בתחילת הטיפול ועשוי לנבוע מהקאות, בחילה ושלשול
- האטה בריקון הקיבה
- דלקת בכיס המרה
- תגובות אלרגיות לרבות פריחה בעור
- תחושת חולי כללית
- דופק מהיר יותר.

נדירות: עלולות להופיע אצל עד 1 מתוך 1,000 משתמשים

- ירידה בתפקוד הכליות
- אי ספיקת כליות חריפה. הסימנים עשויים לכלול ירידה בנפח השתן, טעם מתכתי בפה ונטייה לחבורות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. כיצד לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המצוין על תווית העט ועל האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון באותו החודש.

לפני השימוש הראשון:

יש לאחסן במקרר (2°C עד 8°C). אין להקפיא. יש לשמור הרחק מתא ההקפאה.

לאחר תחילת השימוש בעט:

ניתן לשמור את העט למשך חודש אחד בטמפרטורה הנמוכה מ- 30°C או במקרר (2°C עד 8°C). אין להקפיא. יש לשמור הרחק מתא ההקפאה.

כשאינך משתמש בעט הקפד לכסות אותו במכסה שלו לשם הגנה מפני אור.

אין להשתמש בתרופה זו אם התמיסה אינה צלולה וחסרת צבע, או כמעט חסרת צבע.

אין להשליך תרופות לביוב או לפסולת ביתית. שאל את הרוקח שלך כיצד להשליך תרופות שאין בהן עוד צורך. אמצעים אלה יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה סאקסנדה מכילה

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

propylene glycol, phenol, disodium phosphate dihydrate, hydrochloric acid and sodium hydroxide and water for injections.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

סאקסנדה היא תמיסה להזרקה, צלולה וחסרת צבע או כמעט חסרת צבע, בעט מוכן לשימוש. עט אחד מוכן לשימוש מכיל 18 מ"ג לירגלוטייד.

כל עט מכיל 3 מ"ל תמיסה ומאפשר להזריק מנות של 0.6 מ"ג, 1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג ו-3.0 מ"ג. סאקסנדה זמינה באריזות המכילות 1, 3 או 5 עטים. ייתכן שלא כל גדלי האריזה משווקים. מחטים אינן כלולות.

בעל הרישום וכתובתו: נובו נורדיסק בע"מ, רח' עתיר ידע 1, כפר-סבא 4464301.

שם היצרן וכתובתו: נובו נורדיסק איי.אס., נובו אלה, דיקיי – 2880 בגסוורד, דנמרק.

נערך בינואר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155-64-34553

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

הנחיות לשימוש בסאקסנדה 6 מ"ג/מ"ל, תמיסה להזרקה בעט מוכן לשימוש


קרא את ההנחיות בעיון לפני השימוש בעט סאקסנדה המוכן לשימוש.
אל תשתמש בעט אם לא קיבלת הדרכה מתאימה מהרופא או האחות.
התחל בבדיקת העט כדי לוודא שהוא מכיל סאקסנדה 6 מ"ג/מ"ל, ואז עקוב אחר האירורים שלהלן כדי להכיר את החלקים השונים של העט והמחט.
אם אתה עיוור או אם אינך רואה טוב, ואינך מסוגל לקרוא את מונה המנה על גבי העט, אל תשתמש בעט הזה ללא עזרה. היעזר באדם שרואה היטב וקיבל הדרכה על השימוש בעט סאקסנדה המוכן לשימוש.
העט שלך הוא עט מוכן לשימוש עם בורר מנה בצורת חוגה. הוא מכיל 18 מ"ג לירגלוטייד ומאפשר הזרקת מנות של 0.6 מ"ג, 1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג ו-3.0 מ"ג. העט מיועד לשימוש עם המחטים החד פעמיות נובופיין (NovoFine®) או נובוטוויסט (NovoTwist®) באורך של עד 8 מ"מ ועובי של עד 32G. המחטים אינן מצורפות לאריזה.

מידע חשוב




שים לב להערות אלה מכיוון שהן חשובות לשימוש בטוח בעט.








סאקסנדה, עט מוכן לשימוש
ומחט (דוגמה)










1 הכן את העט עם מחט חדשה





- **בדוק את השם והתווית הצבעונית של העט כדי לוודא שהוא מכיל סאקסנדה.** זה חשוב במיוחד אם אתה משתמש ביותר מסוג אחד של תרופה הניתנת בהזרקה. השימוש בתרופה הלא נכונה עלול להזיק לבריאותך.
- **הסר את מכסה העט.**




	<ul style="list-style-type: none"> • בדוק שהתמיסה שבתוך העט צלולה וחסרת צבע. התבונן דרך חלון העט. אל תשתמש בעט אם התמיסה נראית עכורה.
	<ul style="list-style-type: none"> • קח מחט חדשה ותלוש את לשונית הנייר.
	<ul style="list-style-type: none"> • דחוף את המחט הישר אל תוך העט. הדק אותה בתנועה סיבובית.
	<ul style="list-style-type: none"> • הסר את מכסה המחט החיצוני ושמור אותו לאחר כך. תזדקק לו לאחר ההזרקה על מנת להסיר את המחט מהעט בבטחה.
	<ul style="list-style-type: none"> • הסר את מכסה המחט הפנימי וזרוק אותו. אם תנסה להחזיר אותו למקומו, אתה עלול להידקר בטעות מהמחט. ייתכן שתופיע טיפת תמיסה בקצה המחט. זו תופעה תקינה, אך עדיין עליך לבדוק את זרימת-התרופה אם אתה משתמש בעט חדש בפעם הראשונה. אל תרכיב מחט חדשה על העט לפני שאתה מוכן לבצע את ההזרקה. <p style="text-align: right;"> ⚠ השתמש תמיד במחט חדשה בכל הזרקה. צעד זה יכול למנוע שימוש במחטים חסומות, הדבקה, זיהום והזרקת מנה לא מדויקת. </p> <p style="text-align: right;"> ⚠ לעולם אל תשתמש במחט עקומה או פגומה. </p>
	<p style="text-align: right;">2 בדוק את זרימת התרופה</p> <ul style="list-style-type: none"> • לפני ההזרקה הראשונה שלך בכל עט חדש, בדוק את זרימת התרופה. אם העט שלך כבר בשימוש עבור לשלב 3 "בחר את המנה שלך". • סובב את בורר המנה עד שמונה המנה מצביע על סמל בדיקת הזרימה ().

 <p>ב</p>	<ul style="list-style-type: none"> • אחוז את העט כך שהמחט מופנית כלפי מעלה. לחץ על כפתור ההזרקה ברציפות עד שמונה המנה יחזור ל-0. על הספרה "0" להיות מול סמן המנה. בקצה המחט אמורה להופיע טיפת תמיסה. ייתכן שתישאר טיפה קטנה בקצה המחט, אך היא לא תוזרק. אם לא הופיעה טיפה, חזור על שלב 2 "בדוק את זרימת התרופה" עד 6 פעמים. אם עדיין לא הופיעה טיפה, החלף את המחט וחזור על שלב 2 "בדוק את זרימת התרופה" פעם נוספת. אם עדיין לא הופיעה טיפת תמיסה, זרוק את העט והשתמש בעט חדש. <p>⚠️ לפני שאתה משתמש בעט חדש בפעם הראשונה ודא תמיד שמופיעה טיפה בקצה המחט. צעד זה מוודא שהתמיסה אכן זורמת. אם לא הופיעה טיפה לא תוזרק כל תרופה, אפילו אם מונה המנה יזוז. תופעה זו עשויה להצביע על חסימה או פגם במחט. אם לא תבדוק את זרימת התרופה לפני ההזרקה הראשונה שלך בכל עט חדש, ייתכן שלא תקבל את המנה שנרשמה לך ולא תושפע מהפעילות המיועדת של סאקסנדה.</p>
 <p>א</p> <p>דוגמה נבחרו 0.6 מ"ג</p>	<p>3 בחר את המנה שלך</p> <ul style="list-style-type: none"> • סובב את בורר המנה עד שמונה המנה מראה את המנה שלך (0.6 מ"ג, 1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג או 3.0 מ"ג). אם בחרת מנה לא נכונה, אתה יכול לסובב את בורר המנה קדימה או אחורה כדי לתקן למנה הנכונה. ניתן לכוון את העט למתן של 3.0 מ"ג לכל היותר. בורר המנה משנה את המנה. רק מונה המנה וסמן המנה יציגו את מספר המ"ג שבחרת לכל מנת תרופה. באפשרותך לבחור עד 3.0 מ"ג לכל מנה. כאשר העט שלך מכיל פחות מ-3.0 מ"ג, מונה המנה יעצור לפני שתוצג המנה 3.0 מ"ג. בורר המנה משמיע נקישות שונות כאשר מסובבים אותו קדימה, אחורה או מעבר למספר יחידות המ"ג שנתרו. אל תספור את הנקישות של העט. <p>⚠️ לפני כל הזרקה של תרופה זו, השתמש תמיד במונה המנה וסמן המנה על מנת לבדוק כמה מ"ג בחרת. אל תספור את הנקישות של העט. אל תשתמש בשנתות העט. הן מציגות רק אומדן של כמות התמיסה שנתרה. יש לבחור באמצעות בורר המנה רק מנות של 0.6 מ"ג, 1.2 מ"ג, 1.8 מ"ג, 2.4 מ"ג או 3.0 מ"ג. על מנת להבטיח שתקבל את המנה הנכונה עליך לדאוג שסמן המנה יצביע בדיוק על המנה הנבחרת.</p>
 <p>א</p> <p>הערכה של כמות התמיסה שנתרה</p>	<p>כמה תמיסה נשארה?</p> <ul style="list-style-type: none"> • שנתות העט מציגות לך אומדן של כמות התמיסה שנתרה בעט שלך.

 <p>ב</p> <p>דוגמה</p> <p>מונה המנה עצר: נותרו 2.4 מ"ג</p>	<ul style="list-style-type: none"> • על מנת לבדוק במדויק את כמות התמיסה שנותרה, השתמש במונה המנה: סובב את בורר המנה עד שמונה המנה יעצור. אם סמן המנה מצביע על 3.0, נותרו בעט לפחות 3.0 מ"ג. אם מונה המנה עוצר לפני 3.0 מ"ג, אז אין מספיק תמיסה למנה מלאה של 3.0 מ"ג. <p>אם אתה זקוק לכמות תרופה הגדולה ממה שנותר בעט אתה רשאי לפצל את המנה שלך בין העט הנוכחי לבין עט חדש, אך ורק אם הודרכת על ידי הרופא או האחיות או אם הם הורו על כך. השתמש במחשבון לתכנון המנות לפי הוראותיהם של הרופא או האחיות.</p> <p>⚠ ערוך את החישוב במשנה זהירות.</p> <p>אם אינך בטוח כיצד לפצל את המנה שלך לשימוש בשני עטים, אז בחר את המנה שאתה צריך בעט חדש והזרק אותה.</p>
 <p>א</p>	<p>4 הזרק את המנה שלך</p> <ul style="list-style-type: none"> • החדר את המחט לעורך כפי שהרופא או האחיות הראו לך. • ודא שאתה מסוגל לראות את מונה המנה. אל תכסה אותו באצבעותיך, זה עלול להפריע להזרקה.
 <p>ב</p>	<ul style="list-style-type: none"> • לחץ על כפתור ההזרקה ברציפות עד שמונה המנה יראה 0. על הספרה 0 להיות מול סמן המנה. בשלב זה ייתכן שתשמע או שתחוש נקישה.
 <p>ג ספור באיטיות: 1-2-3-4-5-6</p>	<ul style="list-style-type: none"> • השאר את המחט בתוך עורך וספור באיטיות עד 6 אחרי שמונה המנה חזר ל-0. • אם המחט נשלפה מהעור מוקדם יותר, ייתכן שתראה זרם של תמיסה יוצא מקצה המחט. פירוש הדבר הוא שהמנה לא הוזרקה במלואה.

	<ul style="list-style-type: none"> • הסר את המחט מעורך. אם מופיע דם במקום ההזרקה, לחץ בעדינות על המקום. אל תשפשף את האזור. ייתכן שלאחר ההזרקה תראה טיפה של תמיסה בקצה המחט. זוהי תופעה תקינה והיא אינה משפיעה על המנה שלך. ⚠ התבונן תמיד במונה המנה כדי לדעת כמה מ"ג אתה מזריק. לחץ על כפתור ההזרקה ברציפות עד שמונה המנה מראה 0. • כיצד תזהה מחט חסומה או פגומה? • אם 0 אינו מופיע במונה המנה אחרי לחיצה רצופה על כפתור ההזרקה ייתכן שהשתמשת במחט חסומה או פגומה. • במקרה כזה – לא קיבלת תרופה בכלל – אפילו אם מונה המנה זז מהמנה המקורית שבחרת. <p>מה לעשות אם המחט חסומה? החלף את המחט כמתואר בשלב 5 "אחרי ההזרקה", וחזור על כל השלבים החל משלב 1: "הכן את העט שלך עם מחט חדשה". דאג לבחור את המנה המלאה שאתה צריך.</p> <p>לעולם אל תיגע במונה המנה בזמן ההזרקה. פעולה זו עלולה להפריע להזרקה.</p>
	<p>5 אחרי ההזרקה</p> <ul style="list-style-type: none"> • הכנס את קצה המחט למכסה החיצוני. בצע זאת על משטח ישר, מבלי לגעת במחט או במכסה המחט החיצוני.
	<ul style="list-style-type: none"> • לאחר שהמחט מכוסה, הדק את מכסה המחט החיצוני למקומו בזהירות. • הסר את המחט בהברגה והשלך אותה בזהירות.
	<ul style="list-style-type: none"> • החזר את מכסה העט למקומו על העט אחרי כל שימוש על מנת להגן על התמיסה מפני האור. • תמיד יש לזרוק את המחט אחרי כל הזרקה על מנת להבטיח הזרקות נוחות ולמנוע חסימת המחטים. אם המחט חסומה, לא תוזרק כל תרופה. כאשר העט ריק זרוק אותו ללא מחט מחוברת, לפי ההנחיות שקיבלת מהרופא, האחות, הרוקח או מהרשויות המקומיות. <p>לעולם אל תנסה להחזיר את מכסה המחט הפנימי למקומו על המחט. אתה עלול להידקר מן המחט.</p> <p>⚠ הסר תמיד את המחט מהעט אחרי כל הזרקה.</p> <p>⚠ פעולה זאת תמנע שימוש במחטים חסומות, הדבקה, זיהום, דליפת תמיסה והזרקת מנה לא מדויקת.</p>

	<p style="text-align: right;">מידע חשוב נוסף </p> <ul style="list-style-type: none"> • שמור תמיד את העט והמחטים מחוץ לטווח הראייה ולהישג ידם של אחרים, בעיקר של ילדים. • לעולם אל תחלוק את העט או המחטים שלך עם אנשים אחרים. • על המטפלים לנקוט משנה זהירות בעת הטיפול במחטים משומשות – למניעת פציעה מהמחטים וזיהום צולב.
	<p style="text-align: right;">הטיפול בעט שלך</p> <ul style="list-style-type: none"> • אל תשאיר את העט במכונת או במקום אחר שבו הוא עלול להתחמם או להתקרר יותר על המידה. • אל תזריק סאקסנדה שקפאה. אם תעשה זאת, ייתכן שהתרופה לא תשפיע עליך באופן הרצוי. • אל תחשוף את העט שלך לאבק, לכלוך או נוזלים. • אל תשטוף, תשרה או תשמן את העט שלך. במקרה הצורך, נקה אותו באמצעות סבון עדין על מטלית לחה. • אל תפיל את העט שלך ואל תטיח אותו כנגד משטחים קשיחים. אם הפלת את העט או אם אתה חושד שיש בעיה כלשהי, חבר מחט חדשה ובדוק את הזרימה לפני ההזרקה. • אל תנסה למלא את העט שלך מחדש. לאחר שהתרוקן, יש לזרוק אותו. • אל תנסה לתקן את העט שלך או לפרקו.