

עלון לצרכן לפי התקנות הרחוקים (תשס"ג)

התחנה טו"ו - 1986

התרופה משוקעת על פי מרשם רופא בלבד

דולוקט טבע 30 מ"ג דולוקט טבע 60 מ"ג

כמוסות עמידות	כמוסות עמידות
בחומציות הקיבה	בחומציות הקיבה
חומר פעיל:	חומר פעיל:
כל כמות מילה: דולוקטטין (כהידרוכלוריד) 30 מ"ג	כל כמות מילה: דולוקטטין (כהידרוכלוריד) 60 מ"ג
Duloxetine 30 (as hydrochloride)	Duloxetine 60 mg (as hydrochloride)

מומרים בלתי פעילים ואלרגיים בתכשיר ראה פרק 6 - "מידע נוסף" ופרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.
עלון זה מכליל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלקר.
אז תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לה כי מלתלם דומה.

תרופות נוגדות דיכאון וחרדה מעלות את הסיכון להתנהגות ומחשבות אובדניות בילדים, מתבגרים ומבוגרים פעילים עד גיל 24, עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקורביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: ההמרת דיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות ודכדומה במקרה שחלים שינויים כגון אלה, יש לפנות מיד לרופא.

1. למה מיעדת התרופה?

דולוקט טבע משמשת לטיפול במבוגרים הסובלים מ: דיכאון • הפרעת חרדה חלילה (תחושה כרונית של חרדה או עצבנות) • כאב נורוזתי (תחושה לתיורופתיה סוכרתית היקפית • פיברומיאלגיה • כאב שריר שלד כרוני כאשר לא ניתן ללת תרופות אחר או כשטיפול קודם נכשל

קבוצה תרופית:

דולוקט טבע היא משפחת תרופות SNRI-ו גורמת לעלייה של רמות הסרוטונין (serotonin) והנוראדרנלין (noradrenalin).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

הינך רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הסופסים אשר מילה התרופה (ראה טעיף 6 "מידע נוסף").

הינך סובל מחסלת כבד.

הינך סובל ממחלת כליות קשה.
הינך נוטל או נטלת בן 14- הימים האחרונים תרופה אחרת שיופדה ממואניה אוקסידאז (MAOI - Monoamine Oxidase Inhibitor), כולל מתילן בן תוך ורידי והאנטיביוטיקה לימוזיליד; אין להתחיל טיפול בתרופות מסוג מעכבי מונואמיין אוקסידאז, אם לא עברו לפחות 5 ימים מיזם הפסקת הטיפול בדולוקט טבע; ראה "גבולות בין תרופות".

• הינך נוטל תיוראידין.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה גלאוקומה צרת זוית (Angle Closure Glaucoma) - הרחבת אשיונים, נשגמרת לעיתים כתוצאה משימוש בתרופות נוגדות דיכאון כגון דולוקט טבע, יכולה לגרום במטופלים בעלי מבנה זוויתי צר שלא עברו ניתוח לכירית קשתית.
ליארוע של גלאוקומה מסוג זוית צרה.

לפני הטיפול בדולוקט טבע ספר לרופא אם הינך:

מיניקה

ההיריון או מנסה להיכנס להיריון בזמן שאת נוטלת דולוקט טבע

סובל ממחלת כליות

סובל או סבלת בעבר מפרקוסים (התקפים)

סובל או סבלת בעבר מהפרעה דו-קוטבית (אמניה-דפרסיה) או אמניה

סובל מבעיות בעיניים, כגון סוגים מסוימים של גלאוקומה (לחץ תוך עיני מוגבר)

סובל או סבלת בעבר מליקוה בתפקוד הכבד או אם אתה צורך כמויות גבוהות של אלכוהול – צריכת אלכוהול גבוהה במקביל לנטילת דולוקט טבע עלולה להזיק לכבד.

סובל או סבלת בעבר מדימומים לא תקינים (נטייה לפתח בثورות)

סובל מרמות נתרן נמוכות או אתה בסיכון לירידה ברמות הנתרן (למשל אם אתה נוטל תרופות משתנות, במיוחד אם אתה קשיש)

סובל מבעיות לב או לחץ דם גבוה ואם הינך נוטל תרופות הלוהדת לחץ דם

סובל מסוכרת (הטיפול בדולוקט טבע עלול לפגוע באיזון רמות הסוכר אצל חלק מהחולים)

סובל מקצב התרוקנות איטי של הקיבה

• בעל היסטוריה של שימוש לרעה בתרופות

מחשבות על התאבדות והמרת דיכאון או הפרעת החרדה שלך

דיכאון והפרעות פסיכיאטריות חמורות נוספות ידועים כגורמי הסיכון הגבוהים ביותר לאובדנות. למרות זאת, מחלת המילדים, המתבגרים והבוגרים הצעירים אשר לרונן תרופות נגד דיכאון, נצפתה עלייה במחשבות ובמעשים אובדניים, בעיקר בחולי הטיפול, או כשמהינן משתנה.
אם אתה מדוכאן או סובל מהפרעות חרדה, יכולת לעלות בדתך לפעמים מחשבות על גרימת נזק לעצמך או על התאבדות. מחשבות אלה עלולות להופיע בזיקות גבוהה יותר כאשר מתחילים לטיפול תרופות נוגדות דיכאון.
בדרך חלק בחודשי הראשונים של הטיפול, או כשמהינן משתנה. ייתכן שתהיה לך נטייה רבה יותר לחשוב מחשבות כאלה אם:
היך עובר מחשבות על התאבדות או על גרימת נזק לעצמך.
אתה מבוזר צעיר.
מידע שנסאף בביסויים קליניים הראה, סיכון מוגבר להתנהגות אובדנית אצל מבוגרים בני פחות מ-24 שנים הסובלים ממצבים פסיכיאטריים ואשר טוּלוּ תרופות נוגדות דיכאון.

אתה סובל (או יש לך היסטוריה משפחתית) מהפרעה דו-קוטבית (אמניה-דפרסיה).

שים לב לכל שינוי במצב רוחך, בהתנהגותך, במעשים, במחשבות או ברגשות, במיוחד לשינויים פתאומיים. אם בזמן כלשהו יש לך מחשבות על גרימת נזק לעצמך או על להתאבדות, התקשר לרופא או גש מיד לבית-חולים. יש לב מיוחד לשינויים אלו בתחילת טיפול ולאחר שינוי במינון.

התסמינים הבאים דווחו במבוגרים, ילדים ומתבגרים שטפוּלו בתרופה נגד דיכאון. חרדה, חוסר שקט, התקפי פאניקה, חוסר שיוע, עצבנות, עיונות, ארגסיביות, אפמולסיביות, אקאטיזיה (חוסר מנוחה פסיכו-מוטורית), היפו-מאניה, מאניה, הקשה בן הופעת תסמינים אלו להתמרת דיכאון, ו/או הופעת דחפים אובדניים או הוכח, אולם נראה כי הם מהווים סימנים ראשוניים להתנהגות אובדנית.

ייתכן שיועיל שתייעך קרוב משפחה או חבר קרוב שאתה סובל מדיכאון או שיש לך הפרעת חרדה, ותבקש מהם לקרוא את העלון הזה. אתה יכול לקרוב משך לומר לך אם אלתעת הדיכאון או החרדה שלך ממחירים, אם הם מודאגים משינויים בהתנהגות שלך. כמו כן, הקפד להגיע לכל הפגישות עם הרופא המטפל.

מומלץ חי המטופלים ובני משפחותיהם יעקבו אחר שינויים במצב הרוח וההתנהגות כגון: הגברת החרדה, הקתפי פאניקה, חוסר מנוחה או שקט, מאניה או היפומאניה, תוקפנות או הפרעות בשניה, במיוחד בתחילת הטיפול, או כאשר מהינן משתנה. במקרה שחלו שינויים כגון אלה, יש לפנות מידית לרופא. יש להקפיד הקפדה יתרה על המלצה זאת במטופלים צעירים בגילאי 14-24 שנים.

שימוש בילדים מועדפת בבני פחות מ-18 שנים

דולוקט טבע אינה מיועדת לטיפול בילדים ובמתבגרים בני פחות מ-18 שנים.

גבולות בין תרופות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם וטופסי תהונה, ספר על כך לפי אתה לורוקח.
במידה של ליעיד את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

אנכטרים אחרים המכילים דולוקטטין כגון ינטריב (Yentreb), ש להימע עשימוש בו זמני עם תרופה זו.
בדוק עם הרופא אם אתה נוטל כבר תרופות אחרות שמכילות דולוקטטין

מעכבי מונואמיין אוקסידאז (MAOis - Monoamine Oxidase inhibitors) - עלִיך להימענ מליטול דולוקט טבע אם אתה נוטל, או אם נטלת לאחרונה (14- הימים האחרונים), תרופה מסוג מעכב מונואמיין אוקסידאז (MAOI), נטילת מעכב מונואמיין אוקסידאז (כגון מתילן בלו תור-רידי ו/או לינוזילד) יחד עם תרופות מרשם רבות, כולל דולוקט טבע, עלולה לגרום לתופעות ולאו מחמורות על ידי סכנת חיים.
עליך להמתין 14 ימים לפחות לאחר שהפסקת לטיפול מעכב מונואמיין אוקסידאז לפני שתוכל לטיפול דולוקט טבע. כמו כן, עלִיך להמתין 5 ימים לפחות לאחר שאתה מפסיק לטיפול דולוקט טבע לפני שתוכל לטיפול מעכב מונואמיין אוקסידאז

• תרופות שמעלות את רמת הסרוטונין - התרופות הללו מגבירות את הסיכון לסינדרום סרטונין (ראה פרק 4 "תופעות לוואי")

• משככי כאבים חזקים כגון טרמדול (tramadol) ופנטניל טריפטאנין (triptans) (לטיפול במיגרה)

• טריפטופאן (tryptophan) - חומצה אמינית המופיעה במזונות, המסייעת עריה להזנה וטופסי מזון

• נוגד דיכאון טריציקליים

• פרע נוגד (הפיריקום - St. John's Wort)

תרופות נמדחת דיכאון מקבוצת SSRI ו-SNRI (bupropion) בוספירין

• אמפטמינים

• ליתיום

אם אתה חווה תסמיני יוצא דופן כלשהו בעת לקיחת התרופה כלשהי מבין התרופות האלה יחד עם דולוקט טבע, עלִיך לגשת לרופא.

תרופות המשפיעות על הקלה הדם היווצרות קרשים כגון: וארפרין (קומדין) - יש לעקוב אחר מטופלים הנוטלים וארפרין בנדיחות וביסומי של הטיפול בדולוקט טבע
• תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (NSAIDs) כגון: איבופרופן, נפרוקסן או אספירין.
תרופות הללו עלולות להגביר את הסיכון לדמם

• תרופות המשפיעות על מערכת העצבים המרכזית ומשתנים

• תרופות שמורידות את רמת החומציות בקיבה (עלולות לגרום לשחרור מוקדם של התרופה)

• תרופות המורידות לחץ דם

• דולוקט טבע משפיע על ריכוז תרופות אחרות כדם:

• תאופילין (לטיפול באסתמה)

• נוגד דיכאון טריציקליים כגון: סדיפראמין, נוטרטרפילין, אמטרופיטילין וצימלדין (phenothiazines)

• תרופות לטיפול בפרופאט קצב: פלואקאיד (flecainide), פרופאנזון (propafenone), תירידיזין (thioridazine), השילוב עלול לגרום לבעיות קשות בקצב הלב, או מוות פתאומי

• התרופות הבאות משפיעות על הריכוז של דולוקט טבע בדם: קווינידין (quinidine) לטיפול בהפרעות קצב

• פלואוקטטין (fluoxetine), פלובוקסמין (fluvoxamine), פרוקסטיין (paroxetine)

• סימטידין (cimetidine)

• תרופות אנטימיקרוביאליים המשפחת הקווינולונים כגון: ציפפרולקסין (ciprofloxacin) או אמקסאצין (enoxacin)

הרופא צריך להחליט אם אתה יכול לטול דולוקט טבע יחד עם תרופות אחרות.
אז התחל לזא תפסיק לטול את תרופה, כולל תרופות שנקוו ללא מרשם רופא וצמחי מרפא, לפני שאתה תופיע עם הרופא.

שימוש בתרופה ומזון

ניתן לטול דולוקט טבע עם או בלי אוכל.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לצרוך אלכוהול בכמות גדולה במקביל לנטילת דולוקט טבע כיוון שזה עלול להזיק לכבד.

היריון והנקה

התייעצי עם הרופא או עם הרוקח לפני שאת נוטלת תרופה כלשהי.

הודיעי בזמן שאת לרופא אם הרית או אם את חושבת שאת בהריון בזמן שאת נוטלת דולוקט טבע.
דולוקט טבע עלולה לפגוע בעובר.
עליך להשתמש בדולוקט טבע אך ורק לאחר שדנת עם הרופא והעולות האפשריות ובנדיקים שעלולים להיגרם לעובר.

• ודאי שהמייילדת ו/או הרופא יודעים שאת מטופלת בדולוקט טבע.
כאשר נוטלים תרופות מסוג SSRI ו-SNRI, כולל דולוקט טבע, במהלך סוף השליש השלישי של ההריון, עלול לגדול הסיכון לסיכומים שידרשו אשפוז לתקופה ומשתנה של הילוד, תמכה נשימתית והזנה על ידי צניורת הזנה.
הסיכומים ו/או ילולים להתפתח מיד לאחר הלידה יוכלים לכלול מצוקה נשימתית, כיחלון, הפסקת נשימה, עיונות, חוסר יציבות של טמפרטורת הגוף, קשיי אכילה, הקאות, היפוקלימיה, רפיון שרירים, נוקשות שרירים, רפלקסים מוגברים, רעד, עצבנות, או שקט וכבי ללא הפסקה.
ללא לאחר הלידה מופיע אצל תינוקן תסמין כלשהו מבין אלה, או אם את מודאגת באשר לבריאות התינוק, התייעצי עם המייילדת או עם הרופא.

• ידעי את הרופא אם את מיניקה או מתכננת להניק, דולוקט טבע עוברת חלב אם ועלולה להזיק לתינוק.
שימוש בדולוקט טבע בתקופת ההנקה אינו מומלץ.
התייעצי עם הרופא לגבי הדרך הטובה ביותר להאכיל את תינוקך בזמן נטילת דולוקט טבע.

הגיה ושימוש במכונות

השימוש בתרופה זו עלול לגרום לישנונות או להשיפע על יכולתך להחליט החלטות, לחשוב בבהירות או להגיב במהירות.
ען כן מחייב זהירות בהגיה רכבת, בהפעלת מכונות מסוכנות ובכל פעילות המהייכת ערכת.
אל תנהג ואל שתשתמש במכשירים או במכונות לפני שאתה יודע דולוקט טבע משפיע עליך.

מידע חשוב על מילה המרכיבים של התרופה
דולוקט טבע עולה סוכרוז.
אם הרופא שלך אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוגים מסוימים של סוכר, התייעץ עם הרופא לפני שאתה נוטל את התרופה הזו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. ייתכן שהרופא יסטרך לשנות את המינון עד אשר ימצא את המינון המתאים לך.
המינון המקובל ברך לך הוא:

1.לכאב נורוזתי הנובע מסוכרת:
המינון הרגיל של דולוקט טבע הוא 60 מ"ג פעם ביום.
הרופא שלך יקבע את המינון המתאים לך.

2.לכאב שריר שלד כרוני ולפרעות חרדה כלליות:
רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום, הרופא שלך יקבע את המינון המתאים לך.
אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחילי של דולוקט טבע 30 מ"ג פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.
3. לדיכאון:
רוב המטופלים יקבלו 60 מ"ג פעם ביום.
אצל חלק מהמטופלים יש צורך במינון התחילי של דולוקט טבע 30 מ"ג פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.
יש להתחיל את הטיפול במינון התחילי של 30 מ"ג פעם ביום במשך שבועיים ורק לאחר מכן לשקול לעלות את המינון ל-60 מ"ג פעם ביום.

4. פיברומיאלגיה:
המינון התחילי של דולוקט טבע הינו 30 מ"ג פעם ביום למשך שבוע ולאחר מכן נטילת המינון הרגיל של 60 מ"ג פעם ביום.

לרוב, השפעת הטיפול התרופתי בדולוקט טבע ניכרת לאחר 2-4 שבועות של טיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש

דולוקט טבע נועדה לנטילה דרך הפה.

מכילה בלעות את כל הכמות שלשמונה עם מים.
דולוקט טבע עמליה כדוריות מצופות בצפיפו הלמונע את פירוקן בקיבה.
אי לךך, אין ללעוס או לכתוש את תכולת הכמוסה וזאת לפתוח את הכמוסה ולרדך את תוכנה באוכל או שתיה.
זאת על מנת למנעו השפעה על האוכל או השתיה על ציפי הכדוריות.

כמו כן, התרופה אינה מיעדת לנטילה דרך זונדה הית ותכולת הכמוסה עלולה לחסום את הצניורית.

דבר עם הרופא לגבי משך הזמן שאתה צריך להמשיך לטול דולוקט טבע.
אז תפסיק לטול דולוקט טבע בלי לדבר תחילה עם הרופא שלך.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר, עלִיך להתקשר מיד לרופא או לרוקח, התסמינים של מינון יתר יוכלים לכלול נשינות, תרדמת, תסמונת סרטונין (תגובה שכולה לגרום לעצבנות, תרדמת, קצב לב מהיר, לחץ דם יציב, סחרחורת, זעה, הסקה, חום, רעד, נוקשות שרירים, כיווץ שרירים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה, בחילה, הקאה ושלישלו), פרקוסים, התעלפות, לחץ דם מוגבר, לחץ דם גבוה, הקאות ודוקץ לב מהיר.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית-חולים, והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לטול את התרופה,
אנא טול את המנה ששכחת ברגע שאתה נזכר.
אם זה מועד הקרוב למועד נטילת המנה הבאה, דלע על המנה ששכחת וקח את המנה הבאה בלבד.
אל תטול מנה פחות של דולוקט טבע.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.
גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מספיק את נטילת התרופה:
אם הרופא חושב שאתה זקוק עוד לדולוקט טבע, וזהו יהי לך להקטין את המינון שאתה נוטל בהדרגה לפני הפסקת הטיפול החלוטין, אין להפסיק לטול תרופה זו בצורה פתאומית בלי להיוועץ ברופא.
כאשר אתה מפסיק את נטילת התרופה מהר מדי או עובר מתרופה נוגדת דיכאון מהר מדי ייתכן שתחוש בתסמינים החמורים הבאים: סחרחורת, כאב ראש, בחילה, לשלוש, תחושת ניומה (קוצצוים ודקרות), אי-שקט ועצבנות, הקאות, נדודי שינו, חרדה, בלבול, תחושת חוסר יציבות רגשית, תופעה של היפו-מאניה, טנטון (שמיעת לצלצול באוזן בעת שאין שום צליל יחיוני), עיונות, הזעת יתר ותשישות.

אין לטול תרופות בחושך! בודק היותו יב והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפים גם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדולוקט טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמטופלים. אין תהיה למקרה רישמת תופעות לוואיי. ייתכן שאלה סבול מיתף אחר מתן, יש להפסיק את הטיפול ולפנות מיד לרופא אם מתפתחות התגובות הבאות:

• סימנים לפגיעה בכבד: גירוד, שתן כהה, כאב בחלק העליון הימני של הבטן, הצהבה של העור או של חלקי הלב בעיניים (צהבת), עלייה חדה באזנימי כבד.
בחולים שפיתחו צהבת או כל תסמין אחר המצביע על אי תפקוד כבדי - יש להפסיק את הטיפול בדולוקט טבע.

• תגובה אלרגית חמורה שגורמת לשלפוחיות, פריחה עם

קילוף העור, פצעיים בפה, סרפדות של סמינים אחרים לרגישות יתר - יש להפסיק את הטיפול בדולוקט טבע מיד

עם הופעת תסמינים אלו, מחשש לסינדרום טיטבן לזונסן (Stevens Johnsons Syndrome).

יש לפנות לרופא מיד אם הינך חש באחת מהתופעות הבאות, במיוחד אם הן חדשות, מתמרות או שכן מדאגות אותך:

- נסיגנות התאבדות • דחפים מסוכנים • מחשבות על אלימות • מחשבות על התאבדות או מוות • הופעת דיכאון או החמרה של דיכאון • הופעת חרדה או החמרה של חרדה • התקפות פאניקה • תחושה חזקה של תססה, חוסר שקט • הופעת עצבנות או החמרה של עצבנות • בעיות שינה • עלייה קיצונית בעולות או דיכבור (מאניה) • שינויים אחרים בהתנהגות או במצב הרוח • תסמונת סרטונין • מצב שעלול להיות מסכן חיים; התסמינים עלולים לכלול: תגובה שכולה לגרום לתחושה של שינויים במצב הנפשי (כגון: עצבנות, חרדות, תרדמת), חוסר יציבות אוטונומית (דופק מהיר, לחץ דם בלתי יציב, סחרחורת, הזעת יתר, הסקה, עלייה בחום הגוף), בעיות ניומוסקולריות (רעד, נוקשות, עיונות בשרירים, רפלקסים מוגברים, חוסר קואורדינציה), התקפים, עיונות ולאו תסמינים מוכרת היעכול (כגון: בחילה, הקאה, השלישלו) • דימום חריג • תרופות מסוג SSRI ו-SNRI כולל דולוקט טבע, יכולות להגביר את הסיכון לדימומים כגון: שספי דם תת עוריים (שייתכן שיופיעו גם כנקודות אדמומת על העור), דמם מהאף ועד דימומים מסכני חיים, בעיקר אצל אתה נוטל מידלל דם כגון וארפרין (NSAIDs) תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידליות (NSAIDs) או אספירין.
• ייתכן גם דימום לאחר לידה בשכיחות גבוהה יותר • רמות נמוכות של נתרן בדם (בעיקר אצל מטופלים או מטופלים הנוטלים תרופות משתנות) • התסמינים יכולים לכלול תחושת כאב ראש, קשיי ריכוז, בעיות זיכרון, בלבול, חולשה, חוסר יציבות שעלולה להוביל לפילות.
נפשיים (כגון: עצבנות, חרדות, תרדמת), חוסר יציבות אוטונומית (דופק מהיר יותר מה הודיות, איבוד הכרה, פרקוסים, תרדמת, דום נשימה מוות • לחץ דם מוגבר במתנות סיביבה לעמידה, הגורמת לסחרחורת, לפילות או התעלפות, בעיקר בתחילת הטיפול או לאחר המעלאת המינון. יש לנטר את לחץ הדם לפני תחילת הטיפול ובמהלכו.
הנפילות עשויות להיות קשורות לתת לחץ הדם וכן לגורמים נוספים

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות מאוד

• כאב ראש, נשינות • בחילה, יובש בפה

תופעות לוואי המופיעות לעיתים קרובות

• חוסר תיאבון • הפרעות בשניה, נדודי שינה, אי-שקט, חרדה, קושי או אי יכולת לחוות אורגזמה, חלומות משונים • סחרחורת, צמרמורת, ניומה (לקרות או קוצצוץ בעור) • ראייה מטושטשת • תחושה של דפיקות לב בחזה (פלפליטיות) • עלייה לחץ הדם, גלי חום • סינון מוגברת לפהק • עצירות, דגים, לשלוש, כאב בטן, אי נוחות בטטן, גרישות בטטן, הקאות, הפרעה במערכת העיכול • הזעה מוגברת, פריחה (מגרות) • כאב שרירים, התכווצות שרירים, כאב גבי • יציבות במתן שתן • נשישות • ירידה או עלייה במשקל • כאב בלוע • שינויים בחוש הטעם • תחושה של סחרחורת או יראש מתמובך" (ורטיגו) • חוסר מנוחה • גרד • ירידה בדרמת השתן

תופעות לוואי המופיעות לעיתים רחוקות

• דלקת בגרון שגורמת לזרידות • תחושת מתקן בגרון • מחשבות אובדניות, חריקת שיניים, תחושת בלבול, אדישות, חוסר התמצאות במרחב • תגעות פתאומיות לא רצונית, תחושת אי שקט או חוסר יכולת לשבת או לעמוד בלי לנוע, עצבנות, קושי להתרכז, חוסר קואורדינציה, תסמונת "גלגלים חסרות מנוחה", חוסר יציבות, שינוי מצב רוח, ניסיון התאבדות • קשיי ראייה, יובש בעיניים, ראייה כפולה, התרחבות אשיונים (מדריאזיס) • כאב אוזניים, טנטון (שמיעת