

עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תקשיירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רפואי
קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה:

לכנסיות סטרפן דבש לימון לכנסיות סטרפן בטעם תפוז ללא סוכר

הרכב החומר הפעיל ומוטו/רכיבו:
פלוריבiprofen 8.75 מ"ג בלכנסיה.
Flurbiprofen 8.75 mg/Lozenge

מרכיבים בלתי פעילים - ראה רשימה בסעיף 6. ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" (!)

- קרא בעיון את העalon עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת נספotta, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- התרופה מיועדת למוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים. מתחת לגיל זה יש לפנות לרופא. עליך לשמש בה בצורה נכונה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אל הרופא באם סימני המחלת (סימפטומים) חמירים או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

סטרפן מיועד להקללה לטוווח קצר בסימפטומים של כאבי גרון כגן צריבה בגרון ונפיחות בגרון במוגרים וילדים מעל לגיל 12 שנים.

קבוצה רפואיית- החומר הפעיל בתרופה הוא פלוריבiprofen, השיר' לקבוצה של נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs). קבוצת חומרים אלו גורמת להקללה על ידי שינוי בתגובה הגוף לכאב, נפיחות וחום גבוה.

2. לפני השימוש בתרופה

• אין לשימוש בתכשיר אם:

- הנך רגש (אלרגי) לפלוריבiprofen או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6)
- הנך סובל או סבלת בעבר מכיב עיכולי חזיר (2 אירועים או יותר של כאב עיכולי מוכח) או דימום במערכת העיכול.
- חווית בעבר רגשות יתר (כגון: אסתטמה, עווית הסימפונות, דלקת אף (ריניטיס), אנגיאודמה או סרפהת) לאחר השימוש באספירין או NSAIDs אחרים.
- סבלת מדימום או נקב במערכת העיכול, קוליטיס חמור (דלקת בעיים) או מדימומיים בעת נתילת NSAIDs אחרים.
- הנך נוטל NSAIDs אחרים (כגון סלקרוקסיבן, איבופרובן, דיקלופנק סוד'ום וכו') או אספירין במינון העולה על 75 מ"ג ביום.
- הנך סובל Mai ספיקת לב חמורה, אי ספיקת כבד חמורה או אי ספיקת כליות חמורה.
- את נמצאת בשליש האחרון להריון.
- הנך מתחת לגיל 12 שנים.

• ازהרונות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בסטרפן, היועץ ברופא אם:

- הנך סובל או סבלת בעבר מסטמה או הנך סובל מאלרגיות.
- הנך סובל מדלקת שקדמים או אם הנך חושב שאתה סובל מדלקת חידקית בגרון (הניתנת לטיפול באמצעות אנטיביוטיקה).
- הנך סובל מבעיות בכליה, לב, או בכבד.
- עברת שbez.

- סבלת בעבר ממחלות במערכת העיכול כגון דלקת מעי כיבית (ulcerative colitis), מחלת קרונה.
 - הנר סובל ממחלת אוטואימונית כרונית (כגון צאבת אדמנתית מערכתית או מחלת רקמת חיבור מעורבת).
 - הנר מעל גיל 65 היהת והנר נמצא בסבירות גבוהה יותר לסבול מתופעות הלואין המופיעות בעלו.
 - הנר בששת החודשים הראשונים להריון או מניקה.
- אם אתה נטול, או אם נטלת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקחת:
- מינון נמוך של אספירין (עד מינון של 75 מ"ג ליום).
 - תרופות לטיפול בלחץ דם גבוהה או תרופות לטיפול באירועי ספיקת לב (תרופות נגד יתר לחץ דם או גליקוזידים).
 - תרופות משתנות (כולל תרופות מקובצות משמרי אשלגן).
 - תרופות לדילול דם (נגדן קריישה או נוגדי טסיות).
 - תרופות לשגדון (פרובנציד, סולפינפירוזן).
 - נוגדי דלקת לא סטרואידים (NSAIDs) אחרים, או קורטיקוסטרואידים כגון: סלקוקסיב, איבופרופן, דיקלופנק סודיום או פרדניזולון).
 - מיפפריסטן (תרופה להפסקת הריון).
 - אנטיביוטיקות מקובצות הקווינולוניים (כגון צ'יפורופלאוקסצין).
 - תרופות מדכאות מערכת החיסון (כגון ציקלוספורן, טקרולימוס).
 - פנטואין (טיפול באפילפסיה).
 - מתוטרקטט (טיפול במחלות אוטואימוניות או סרטן).
 - ליתיאום או תרופות מקובצות מעכבים סלקטיביים של קליטה חוזרת של סרוטוניין (SSRIs) (טיפול בדיכאון).
 - תרופות אנטי סוכרטניות הנלקחות דרך הפה (טיפול בסוכרת).
 - זידובודין (תרופה לטיפול באידס).

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע מצריכת אלכוהול במהלך הטיפול בסטרפן, לאחר ואלכוהול מעלה את הסיכון לדימום בהריון או במעיים.

הריון והנקה

אין ליטול את התרפיה במהלך שלושת חודשים הראשונים.

התיעיצ' עם הרופא לגבי שימוש בסטרפן במהלך ששת חודשים הראשונים או אם הין מניקה.

פלוריביפורפן משתמש לקבוצת תרופות העוללות להביא זמנית לירידה בפוריות נשים. תופעה זו היא הפיכה עם הפסקת נתילת התרפיה. לא סביר שהתרופה, הנלקחת מעט לעת, תשפיע על סיכון להרות. עם זאת, ספרי לרופא לפני נתילת התרפיה אם ידוע על קשיים להרות.

נהיגה ושימוש במכוניות

לא נבדקה השפעת התרפיה על יכולת הנהיגה ושימוש במכוניות. עם זאת, סחרחות והפרעות ראייה הן תופעות לוואי אפשריות לאחר שימוש בתרופות משפחת נוגדי הדלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs). אם הנר חש בתופעות אלו, הימנע מנהיגה ומשימוש במכוניות.

מיעד חשוב על חלק מהמרכיבים של התרפיה (!)

סטרפן דבש לימון:

- כל לכטינה מכילה: 1069 מ"ג גלוקוז נזלי; 7047 מ"ג סוכרוז נזלי. יש להתחשב בכך בטיפול בחולי סכרת. אם נאמר לך שהיין סובל מאירועים מסוימים, יש להתייעץ ברופא לפני תחילת הטיפול בסטרפן.

• מכיל רמות נמוכות מאוד של גלוטון (מעמילן חיטה) המצויה בגלוקוז נזלי. התכשיר נדרש ללא גלוטון ולא סביר שהתכשיר יגרום לביעות כלשהן בחולי צלייך. לכטנית אחת מכילה לא יותר מ- 21.32 מיקרוגרם של גלוטון. **אין לקחת סטרפן דבש לימון אם הנר סובל מאלרגיה לגלוטון** (מצב השונה מהמחלה צלייך).

• מכיל סולפיט – גופרית דו חמצנית (E220) (הנמצאת בגלוקוז נזלי) אשר לעיתים רחוקות עלול לגרום לתגובה אלרגית או לעוויות הסימפונות.

• מכיל מרכיב טעם הכלול Citral,Citronell, d-Limonene, Farnesol, Geraniol, ו- Linalool העולאים לגרום לתגובה אלרגית.

• מכיל שומן Butylated Hydroxyanisole (E320) (הנמצא במרכיב טעם לימון 0-1%) העולול לגרום ל תגובה עורית מקומית (כגון דלקת עור - דרמטיטיס) או גירוי של העיניים וממברנות מוקזיות.

סטרפן בטעם תפוז ללא סוכר:

• מכיל איזומלט 29 מ"ג/לכטנית וכן מלטיטול נזלי 509.31 מ"ג/לכטנית. תיכון השפעה משלשלת קלה. הערך הקלורי של מלטיטול או איזומלט : 2.3 קילו קלוריות/גרם.

אם נאמר לך שהנר סובלמאי סובילות לסוכרים מסוימים, יש להתייעץ ברופא לפני תחילת הטיפול בסטרפן.

• מכיל מרכיב טעם הכלול Citral,Citronell, d-Limonene, Geraniol, ו- Linalool העולאים לגרום לתגובה אלרגית.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין לך בעותה. **מבוגרים, קשישים וילדים מעל גיל 12 שנים:**

המינון המקובל הוא לכטנית אחת למציצה/המסה בפה כל 6-3 שעות. יש למצוץ את הלכטנית באיטיות, תוך כדי העברתה באיטיות בחלל הפה וזאת בכדי להמנע מגירוי מקומי. **אין צורך יותר מ-5 לכטניות במשך תקופה של 24 שעות.** אין לעבור על המנה המומלצת.

תרופה זו מיועדת לתינוקות ולילדים מתחת לגיל 12 שנים. תרופה זו מיועדת לשימוש קצר טוווח בלבד. יש ליטול את המנה הנמנוכה ביוטר המשיגת את מטרת השימוש ולמשך התקופה הקצרה ביותר הדרישה להקללה על התסמים (סימפטומים). אם הנר חש גירוי בחלל הפה, יש להפסיק את השימוש בתרופה. **אין ליטול תרופה זו במשך למעלה מ- 3 ימים אלא בהוראת רופא.** אם לא חל שיפור במצבך תוך 3 ימים, או אם חלה החמרה במצבך, או אם הנר סובל מתסמים (סימפטומים) חדשים, יש לפנות לרופא.

אם נטילת בטעות מינון יתריתן שתחוש בנמנום או בחילה.
אם נטילת מנת יתר או אם בטעות בעל יلد מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך, גם אם אתה חש טוב.
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטולמנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגע ואל תעבור על המנה המומלצת. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסטרפן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשיימת תופעות לוואי. תיכון ולא תסבול מכך אחת מהן.

יש להפסיק מיד את נטילת התרופה ולפנות מיד לרופא אם:

- מופיעים סימנים של תגובה אלרגית חמורה כגון אסתמה, צפיפות לא מוסברים או קצר נשימה, גירוד, נזלת, פריחות בעור וכו'.
- נפיחות בפנים, בגרון או בלשון, הגורמים לקושי בנשימה, קצב לב מהיר, וירידה בלחץ הדם המוביל להלם (מצב זה עלול להתרחש אף בשימוש הראשוני בתרופה).
- תגובהות עוריות חמורות כגון קילוף העור או הופעת שלפוחיות על פני העור.

יש לפנות לרופא אם מופיעות תופעות הלואין הבאות:

תופעות לוואי שכיחות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 10 משתמשים) :

- סחרחוורת, כאב ראש גירוי הגרון
- כאבים בפה או כאב בפה כאב גרון
- אי נוחות או תחושה מוזרה בפה (כגון תחושת חמיימות, צריבה, נימול, עקצוץ וכוכ')
- בחילה ושלשלול
- תחושת עקצוץ וגירוד בעור נמנום
- שלפוחיות בפה או בגרון, חסור תחושה בגרון, נפיחות בבטן, כאב בטן, גזים, עצירות, קשיים בעיכול, הקאות.
- יובש בפה.
- תחושת צריבה בפה, שינויים בחוש הטעם.
- פריחות עוריות, גירוד בעור.
- חום, כאב.
- תחושת ישנוניות או קשיי הרדמות.
- החמרה באסתמה, צפופים, קצר נשימה
- ירידת בתחושה בגרון

תופעות לוואי נדירות (עלולות להשפיע על 1 מתוך 1000 משתמשים):

תגובה אנטיפילקטית (תגובה אלרגית קשה ומסכנת חיים הגרמת לקשיי נשימה וללחץ דם נמוך בדרجة מסווגת).

- תופעות לוואי בשכיחות שנייה ידועה (לא ניתן לקבוע שכיחותן מהמידע הקיים)**
- אנמיה, טרומבוציטופניה (ספרה נמוכה של טסיות الدم שעשויה להעלות את הסיכון לשטפי דם ולדימומיים).
 - נפיחות (בצקת), לחץ דם גבוה, אי ספיקת לב או התקף לב
 - תגובהות עוריות חמורות הכוללות פריחה מופשטת עם שלפוחיות כלל תסמונת סטייב-ג'ינסון, תסמנות ליאל וצורה חמורה יותר הגרמת לקילוף העור ביותר מ-30% משטח הגוף (טוקסיק אפידרמאל נקרוליסיס).
 - דלקת כבד (הפטיטיס).

אם הופיעה תופעת לוואי, אםichert מתופעות הלואין חמירה, או אם הינך סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor:

<http://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנע הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ואו תינוקות ועל ידי כך תמנع הרעללה. **אל תגרום להתקאה ללא הוראה** מפורשת מהרופא.

○ אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זוקן להם.

○ אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (expiry date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתוייחס ליום האחרון של אותו חודש".

○ אחסון מתחת ל- 25°C, באזירה המקורי.

6. מידע נוספת

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

סטרפן דבש לימון:

Liquid Sucrose, Liquid Glucose, Honey, Macrogol 300, Lemon Flavour, Potassium Hydroxide, Levomenthol.

סטרפן תפוז ללא סוכר:

Macrogol 300 (Polyethylene glycol 300), Potassium hydroxide, Orange Flavour PHL 010300, Levomenthol ,Acesulfame K, Liquid Maltitol, Isomalt.

כיצד נראה תרופה ומה תוכן האריזה:

לכנסיות סטרפן דבש לימון הין עגולות, בעלות גוון צהבהב עד חום בהיר, עם סמל מוטבע על שני צדי הלכשניה.
הלכשניות א Rozot כ- 2,4,6,8,10, 12,16 או 24 לכנסיות באזירה. יתכן ולא כל גדי האריזות משוקקים.

לכנסיות סטרפן בטעם תפוז ללא סוכר הין עגולות, בעלות גוון לבן עד צהוב בהיר,
עם סמל מוטבע על שני צדי הלכשניה.
הלכשניות א Rozot כ- 16, 24 או 36 לכנסיות באזירה. יתכן ולא כל גדי האריזות משוקקים

היצן וכתובתו:

רקייט בנקיזר הלט'קר אינטראנסיונל בע"מ. נוטינגהム, אנגליה.

בעל הרישום וכתובתו: רקייט בנקיזר (נייר איסט) בע"מ, הנגר 6, הוד השרון, ישראל
4527704.
נערך בדצמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
סטרפן דבש לימון 00-31684-77-147
סטרפן בטעם תפוז ללא סוכר 00-34072-42-153

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נכתב בלשון זכר על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.