

**עלון לזכרון לפי תקנות הרוחחים (מגשריים) השמיני - 1986**
תורפה זו משוקעת על פי משרש רופא בלבד

<b>רוזובסטטין אינובמד</b>	<b>רוזובסטטין אינובמד</b>
<b>5 מ"ג</b>	<b>10 מ"ג</b>
<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>

הרכב: <p>כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 5 מ"ג (קלקליום) Rosuvastatin 5 mg (as calcium)</p>	הרכב: <p>כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 10 מ"ג (קלקליום) Rosuvastatin 10 mg (as calcium)</p>
--	--

<b>רוזובסטטין אינובמד</b>	<b>רוזובסטטין אינובמד</b>
<b>20 מ"ג</b>	<b>40 מ"ג</b>
<b>טבליות מצופות</b>	<b>טבליות מצופות</b>

הרכב: <p>כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 20 מ"ג (קלקליום) Rosuvastatin 20 mg (as calcium)</p>	הרכב: <p>כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 40 מ"ג (קלקליום) Rosuvastatin 40 mg (as calcium)</p>
--	--

רשימת החומרים הבלתי פעילים הולגרינים בתכשיר:
ראו טקס 2 "מידע חשוב על חלק המהמריבים על התורפה" וטקס 6 "מידע נוסף".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתשתמש בתורפה.**
נשפות, פנה אל הרופא או אל הרוחק.

תורפה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להיקל להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

**רוזובסטטין אינובמד אינה מיועדת לילדים ולמתגברים מתחת לגיל 18 שנה.**

**1. למה מיועדת התורפה?**

- רוזובסטטין אינובמד מיועדת לטיפול במבוגרים:
היפרכולסטרולמיה ראשונית (מסוג IIa כולל היפרכולסטרולמיה משפחתית הטרוזיגוטית) (מצבים בהם יש רמת כולסטרול גבוהה גדם) או דיסליפידמיה מעורבת מסוג III (הפרעה ברמת הטריגליצריד השונים בדם). התורפה ניתנת כתוספת לדיאטה במצבים בהם התרגוב לדיאטה וטפילים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- היפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים (להורדת רמת השומנים בדם (כגון סילוק שומנים LDL apheresis) או במקרים בהם טפילים אלו אינם מתאימים.

**קבוצה תרופית:**

מעכב אנזים HMG-CoA reductase.

רוזובסטטין אינובמד ישיכת לקבוצת תרופות הנקראות סטטינים. תופעת לוהרות רמות השומנים בדם, הנפץ ביותר בקרב כולסטרול שנים מספר סופו כולסטרול בדם, "כולסטרול רע" ו-"כולסטרול טוב".

רוזובסטטין אינובמד פועלת ומסייעת לגוף להפחית את יצוא ה"כולסטרול הרע" ובפניו מגורף ומסייעת להעלות את רמת ה"כולסטרול הטוב".

**2. לפני השימוש בתורפה**

**אין להשתמש בתורפה אם:**

<b>אתה גרש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמהמריבים הנוספים אשר מכילה התורפה (אם ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמריבים על התורפה").</b>
<b>הינך בהריון</b> , או מתקיימת, אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין אינובמד <b>הספיקי לטיפול רוזובסטטין אינובמד מיידית ודעה את הרופא שלך</b> . יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
<b>על ידי מחלת בלבד.</b>
<b>הינך סובל מעמירות לילה חמורות.</b>
<b>הינך סובל ממיחושים או כאבי שרירים חזרים או בלתי מוסברים.</b>
<b>מוסריים</b>
<b>הינך סובל ממיחושים או כאבים חזרים או בלתי מוסברים</b> , אם הינך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשרירים, או נסבל בעבר מבעיות בשרירים בעת טיול תרופות אחרות להורדת הכולסטרול.
<b>הינך צורך כמיות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.</b>
<b>מוצאך אסיאתי</b> (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאנאמי, יפני).
<b>הינך סובל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פירבאטיס.</b>
<b>אתה מדא מלאו נוגע אלקי (או אם יש לך ספק), אתה פנה לרופא שלך.</b>
<b>בנוסף אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:</b>
<b>הינך סובל מעמיות מתוננת בתפקוד הכליה (אם יש ספק, אתה פנה לרופא).</b>
<b>הינך סובל מעמיות כבולות בלוטת התריס (תירואיד).</b>
<b>הינך סובל ממיחושים או כאבים חזרים או בלתי מוסברים</b> , אם הינך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשרירים, או נסבל בעבר מבעיות בשרירים בעת טיול תרופות אחרות להורדת הכולסטרול.
<b>הינך צורך כמיות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.</b>
<b>מוצאך אסיאתי</b> (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאנאמי, יפני).
<b>הינך סובל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פירבאטיס.</b>
<b>אתה מדא מלאו נוגע אלקי (או אם יש לך ספק), אתה פנה לרופא שלך.</b>

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ברוזובסטטין אינובמד:**

- לפני השימוש ברוזובסטטין אינובמד רפר לרופא אם:**
- הינך סובל מלקייה בתפקוד הכבד, הכליית או בלוטת התריס.**
- הינך סובל ממיחושים או כאבים חזרים או בלתי מוסברים** מעמיות בשרירים, או שיש לך היסטריה של בעיות בשרירים בעת לקיחת תרופות אחרות להורדת כולסטרול. יש ליידע מיד את הרופא המטפל אם מופיעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים אוקלורים במיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית או נטוב או שום. יש ליידע את הרופא גם אם הינך סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- הינך סובל או נסבל בעבר ממוסטיטיס (מחלה עם חולשת שרירים כללית היכולת לעריות שרירים המשתנים לפימה), או מיאסטיניה אוקלורית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין).** מאחר שסטטינים עריתים עלולים להחליש את המהליה או לגרום להתרחשותה (ראה סעיף 4).
- הינך גורר כמיות גדולות של אלכוהול באופן קבוע.**
- הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פירבאטיס**, אתה קרא נעוה או בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- הינך נוטל תרופות מיוחדות לטיפול בגנין הפשל החיסוני הגבוש (כגון רטרווירי עם לופיברז או אטאזאנאביד).** אתה פנה לרופאך **אין** אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות.
- הינך נוטל או נטלת אנטיביוטיקה הבילה-תרומה פוסידית 7-7 הימים האחרונים** (לטיפול ביהומם חיידקי, בלביעה או בהורקה). השילוב של חומצה פוסידית ורוזובסטטין אינובמד עלול לגרום לבעיות שריר חמורות (רדומיולייזיס). אתה פנה לרופאך **אין** אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות.
- הינך נוטל למעל ל-70 מ"ג (מינון יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין אינובמד מתאימים לך).**
- הינך סובל ממיחושים שמימי חמור.**
- אתה אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור שלפוחיות ולאז כאבים בפה לאחר נטילת רוזובסטטין אינובמד או תרופות קשורות אחרות.**
- מוצאך אסיאתי** (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאנאמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין אינובמד מתאימים לך.

את אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אלקי (או אם אינך בטוח):

**אין לטויל רוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) ברוקם ולקחת את הרוקם לפני תחילת השימוש ברוזובסטטין אינובמד בני עוק.**

תגובות עור חמורות כולל תסמונת טיבנס-ג'ונסון ותסמונת התגובה התרופתית עם אופיונפיליה ותסמינים מערכיים (דרזס) דווחו בהקשר לטיפול ברוזובסטטין אינובמד. הפסק להשתמש ברוזובסטטין אינובמד ופנה לעזרה רפואית מיידית אם הינך מחזין באחד מהתסמינים המוארמים בסעיף 4.

מכספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המהווה בדיקתם עד פשוטה הבדיקת עלייה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא יבקשך לבצע בדיקות דם של הפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול ברוזובסטטין אינובמד.

בזמן שהינך מטופל בתורפה זו, הרופא שלך יבצע מעקב דרוק אם יש לך סוכרת או אם הינך בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שהינך בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך תגובת גבוהות של סוכרים ושומנים בדם. או אם יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

**ילדים ומתגברים:**
**רוזובסטטין אינובמד אינה מיועדת לילדים ולמתגברים מתחת לגיל 18 שנה.**

**אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות:**
**אתה פנה לרופא או להקת להאזרעה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוחק:**

- ציקלוספורין (בישמש לאחר השתלת איברים)
- וארפרין, קלפידוגרל או טיקגדולר (או כל תרופה אחרת לזילול דם)
- פירבאטיס (כגון גמפיברזיל או פנופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אטימיב)
- הורפוזל לקלוק קיבה (משמשות כסחורי חומצה בקיבה)
- איריתומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה - ברוזובסטטין אינובמד)
- גלולות למניעת הריון
- גורופיב (לטיפול בסרטן)
- דרזולומטר (לטיפול בסרטן)
- קמפטיסיב (לטיפול בסרטן)
- טיפול הורמונלי חלופי
- פוסטמטייב (לטיפול בספירת טסיות נמוכה)
- בוקוסטסט (לטיפול ומניעה של רמות גבוהות של חומצת שתן בדם)
- טרופינומיד (לטיפול ברשתת נפורה)

התופות לטיפול ביהומים וריאלים, כולל לגוף הכשל החיסוני (ריבש (HIV) או מיתת בדי (הפטיטיס) מסוג C, לבד או בשילוב עם (או ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ברוזובסטטין אינובמד"); רטרווירי, לופיברז, אטאזאנאביד, רוסוסובוירי, וקסילופריבז, אמביסטרבי, פרטיסטרבי, דסבווירי, ולפטסטרבי, גרוזופרברי, אלכסטרבי, גלקופרברי, פירגוסטרבי.

השפעה של תרופות אלו עלולה להשתנות על ידי שימוש בו נמית עם רוזובסטטין אינובמד או שזן עלולות לשנות את השפעה של רוזובסטטין אינובמד.

- חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) - אם עליך לטויל חומצה פוסידית במתן דרך הפה לטיפול ביהומם חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול ברוזובסטטין אינובמד.**
- הרופא יבחר לך מתי ניתן לקחת לטויל רוזובסטטין אינובמד. נטיילת רוזובסטטין אינובמד עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעריתם נדירות לחולשה, רגישות, או כאב בשרירים (רדומיולייזיס). נא ראה מידע נוסף לגבי רדומיולייזיס בסעיף 4.**

**שימוש בתורפה ומזון:**

ניתן לטויל רוזובסטטין אינובמד ללא קשר למזון.

**היון הנקה:**

**אין לטויל רוזובסטטין אינובמד אם הינך בהריון או מתקיימת, אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין אינובמד הספיקי לטיפול רוזובסטטין אינובמד מיידית ודעי את הרופא שלך**. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בהקפדת הטיפול בתורפה זו.

היועוץ עם הרופא או הרוחק שלך לפני נטילה של כל תכשיר.

**הניהג ושימוש במכונית:**

מרבית המטופלים יכולים לנהוג ברכב ולהפעל מכוונת בזמן השימוש ברוזובסטטין אינובמד – התרופה לא תפגע בכשירותם לבצע פעולות אלו. אולם, חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש ברוזובסטטין אינובמד. אם הינך חש סחרחורת עליך לפנות לרופא בטרם הפעלת מכוונת או נהיגה ברכב.

**מידע חשוב על חלק מהמהמריבים של התורפה:**

התורפה מכילה לקטוז מונוהידראט אשר הינו כווג של סוכר, אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לקטוז או אין יסויל לעכל סוכרים מסוימים, היועוץ ברופא לפני נטילת תורפה זו. התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתרן.

אתה ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

**3. כיצד תשתמש בתורפה?**

יש להשתמש בתורפה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוחק אם אתה צורך בנגוע למינון ואופן ההטפיה בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **המינון המקובל בדרך כלל:**

הטיפול עם רוזובסטטין אינובמד יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במינון התחלתי ההיה תלויה בו: רמת הכולסטרול.

את רמת הסיכון שחלקה בהתקף לב או שבץ מוחי. מידת הסבירות כי תחיה רגיש יותר לתופעת לוואי אפשרית. אתה היועוץ ברופא או ברוחק שלך לגבי המינון שחיי מתאים עבורך.

ייתכן כי הרופא חלטי לתת את המינון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:
מוצאך **אסיאתי** (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, יאנאמי, יפני).

הינך גורר **70 מנועה**.

הינך סובל מעמיות מתוננת בתפקוד הכליית.

הינך בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).

**העלאת המינון והמינון יומי מרבי**

ייתכן להעלות תלילית להעלות את המינון שאתה נוטל על מנת שתיאיים עבורך. אם התחלת עם מינון של רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג, ייתכן שהרופא יכפיל את המינון לרוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג במידת הצורך. יעלה 40-10 מ"ג. אם התחלת עם מינון של רוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג, ייתכן שהרופא יכפיל את המינון ל-20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המספיק להימיו הינו 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמת גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה לקטות בהתקף לב או שבץ מוחי, כאשר רמת הכולסטרול אינו ירדות מספיק עם 20 מ"ג.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

את נוטלים כסחורי חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום. יש ליטול את הרוזובסטטין אינובמד לפחות שתיים לפני נטילה של סחורי חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע למה הרואיה שרשמך זו ושמתך. ייתכן כי הרופא יחלטי להעלות את המינון של התכשיר על מנת שתיקח את כמות הרוזובסטטין אינובמד שמתאימה לך.

ניתן לקחת את התרופה בכל שעות היום עם או ללא מזון. בכדי לזכור לקחת את התרופה נמנעל ליהוט עם התרופה יום יום בשעה קבועה.

יש בלבות על הטבליות בשלמותן עם מים.

אין מידע בנוגע לריסוק, צהייה וכתישת הטבליה.

**את נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים.

את נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ליד מן התורפה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים הבאת את אריזת התרופה איתך.

**את שכתה ליטול את התרופה**, יש לזלג על הפנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בהתאם למה המניס הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד כדי לפצות על זו שנשכחה.

יש להמדיד בטיפול כפי שזומנעל על ידי הרופא. גם אם חש שישוך במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתורפה ללא תחייצעות עם הרופא.

**את אתה מספיק את נטילת התרופה** רמות הכולסטרול שלך ששויות לעלות שוב.

**אין ליטול תרופות בחושהן** בזמן הוויתור והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. **את יש את שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועוץ ברופא או ברוחק.**

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזובסטטין אינובמד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תבהיל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאל אחת מהן.

**תופעות המתייבות תחייבות מיוחדות, הפסק את הטיפול ברוזובסטטין אינובמד אם:**
**על שך אתח מתגובות רגישות חרות (אלרגיה) הבאות:**

- קש רגישות עם או ללא נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
- נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעלולים לגרום לקשחי בליעה.
- גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מרומח).

**2. قبل استعمال الدواء**

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

<b>•</b> كنت حساساً للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (الرجاء أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء").
<b>•</b> كنت حاملاً أو مرضعة. إذا كانت حاملاً خلال استعمال روسوفاستاتين إينوفامد فتوقفي عن تناول روسوفاستاتين إينوفامد فوراً وبلغي طبيبك. يجب الامتناع عن حصول حمل عن طريق استعمال وسائل منع حمل ملائمة.
<b>•</b> وُجد لديك مرض كبدِي.
<b>•</b> كنت تعاني من مشاكل خطيرة في الكلية.
<b>•</b> كنت تعاني من أوجاع أو من آلام عضلية متكررة أو مجهولة السبب.
<b>•</b> كنت تتناول مزيج من الأدوية سوسوفوسفير/فيلبئاتاسفير/فوكسكسلايبريفير (الاستعملة لعلاج ثلوث فيروس سي كبدِي الممسي التهاب كبدِي C).
<b>•</b> كنت تتناول سيكلوسبوريين (مثلاً استعمال سيكلوسبورين بعد زراعة أعضاء).
<b>•</b> كنت دون عمر 18 سنة.
<b>إذا</b> كان واحد من هذه ينطبق عليك (أو إذا كان لديك شك). الرجاء التوجه لطبيبك.
<b>بالإضافة لذلك، لا يجوز استعمال أقراص الـ 40 ملغ (الجرعة الوائتية الأعلى) إذا:</b>
<b>•</b> كنت تعاني من مشاكل معتدلة في الأداء الوظيفي الكلوي (في حالة الشك، الرجاء التوجه للطبيب).
<b>•</b> كنت تعاني من مشاكل في نشاط الغدة الدرقية (thyroid).
<b>•</b> كنت تعاني من أوجاع أو من آلام عضلية متكررة أو مجهولة السبب، إذا كانت لديك سابقة عائلية أو شخصية لمشاكل عضلية، أو عانيت في الماضي من مشاكل عضلية عند تناول أدوية أخرى لخفض الكولسترول.
<b>•</b> كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم.
<b>•</b> كنت أسوي الأصل (صيني، فليبييني، هندي، كوري، فيتنامي، ياباني).
<b>•</b> كنت تتناول أدوية إضافية لخفض الكولسترول المسماة <b>فيربات</b> إذا كان واحد من هذه ينطبق عليك (أو إذا كان لديك شك). <b>الرجاء توجه لطبيبك.</b>

**تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال روسوفاستاتين إينوفامد:**

- قبل العلاج به روسوفاستاتين إينوفامد إحك لطبيب إذا:
- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكبد، الكلى أو الغدة الدرقية.
- كنت تعاني من أوجاع أو من آلام عضلية متكررة أو مجهولة السبب.
- أو إذا عانيت أو عاني أحد أفراد عائلتك في الماضي من مشاكل عضلية، أو لديك سابقة لمشاكل عضلية عند تناول أدوية أخرى لخفض الكولسترول. يجب إبلاغ الطبيب المعالج فوراً إذا ظهرت أوجاع أو آلام عضلية يجب في العلاجات خاصة إذا تراكمت تلك بشعور عام سيء أو سخونة. يجب إبلاغ الطبيب أيضاً إذا كنت تعاني من ضعف عضلي مستمر.
- **كنت تعاني أو عانيت في الماضي من وهن عضلي** (مرض يترافق بضعف عضلي عام يشمل أحياناً عضلات التنفس)، أو من وهن عضلي عيني (مرض يؤدي إلى ضعف في عضلات العين)، لأن اللانتيات أحياناً قد تتفاقم المرض أو تؤدي إلى حدوثه (أنظر الفقرة 4).
- **كنت تستهلك كميات كبيرة من الكحول بشكل دائم.**
- **كنت تتناول أدوية إضافية لخفض الكولسترول المسماة فيبربات،** الرجاء إقرأ هذه النشرة بتضمن حتى ولو استعملت في الماضي أدوية لخفض الكولسترول.
- **كنت تتناول أدوية مخصصة لعلاج فيروس العوز المناعي البشري (مثل ريتونايفير أو لوبينافير و/ أو إيتازانافير).** الرجاء راجع الفقرة **التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية**.
- **كنت تتناول أو تناولت مضافاً جويوا يحتوي على حمض الفوسفيدك (أو بالحقن)،** إن مشاركة حمض الفوسفيدك وروسوفاستاتين إينوفامد قد يؤدي إلى مشاكل عضلية خطيرة (إحلال العضلات المخططة). الرجاء راجع الشفرة "التفاعلات/التفاعلات بين الأدوية".
- **تناوژت عمو 70 سنة** (مرفق بخاتل الطبيب جرعة دوالية ابتدائية متنازلة لك من روسوفاستاتين إينوفامد).
- **كنت تعاني من فشل تنفسي حاد.**
- **إذا تطوّر لديك ذات مرة طفح جلدي خطير أو تقشّر في الجلد، أو حوصلات و/ أو آلام في الفم بعد تناول روسوفاستاتين إينوفامد أو أدوية متعلقة أخرى.**
- **كنت أسوي الأصل (صيني، فليبييني، هندي، كوري، فيتنامي، ياباني)** سوف يختار الطبيب جرعة دوالية ابتدائية مناسبة لك من روسوفاستاتين إينوفامد.

- **كتميم** آدموميم שאינם מוגברים, דמויי מטרה או מגליים - **הגוף**, לעיתים עם שלפוחיות מרכזי, קילוף עור, כיבים בפה, גרון, כאף, כאבי רגליים. **פריחת** עור - תגובות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת טיבנס-ג'ונסון).

- **פריחה מפושטת**, חום גבוה ובלבנות ליפה מודולות (תסמונת DRESS או תסמונת רגישות חרות לתרופה).

**יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים**, אשר נמשכים זמן רב יותר מהמعتופ. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מומצם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשרירים. ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים. פוגעת בשרירים ודוידעה בשם רדומיולייזיס (rhabdomyolysis).

**יש לך קשת בשרירי**

**יש לך תסמונת דמוית זאבת** (lupus-like disease) (כולל פריחה, הפרעות במפקדים והשפעה על תאי הדם).

**תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב-10-14 משתמשים מתוך 100):**

- כאבי ראש
- כאבי בטן
- עצירת הרגשת חולי
- כאב שרירים
- חולשה
- סחרחורת
- עלייה בכמות החלבון בשתן - זו בדרך כלל חזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור רוזובסטין אינובמד 40 מ"ג).
- סוכרת, הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם הינך בעל רמת גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

**תופעות לוואי שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 1,000):**

**פריחה בעור.**

גרד או תגובות עוריות אחרות.

עלייה בכמות החלבון בשתן - זו בדרך כלל חזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור רוזובסטין אינובמד 5 מ"ג, 10 מ"ג או 20 מ"ג).

**תופעות לוואי נדירות (rare) (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):**

- תגובה אלרגית חמורה** שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבלעיה ושימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מרומח), **את הינך חושש שיש לך תגובה אלרית, הפסק לקחת רוזובסטטין אינובמד** ופנה מיד לעזרה רפואית.
- פגיעה בשריר במבוגרים – **לדבר** עם הרופא שלך מיד אם אתה חש **מיחושים או כאבי שרירים לא רגילים** הנמשכים יותר זמן מהמعتופ.
- כאב בطن חמור (לקת בלבבל).
- תמונה דיאגנוסטי בלבד בדם.

דימום או נטייה מוגברת לבלות בשל רמות נמוכות של סטיט דם.

**•** **תסמונת דמוית זאבת** (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפקדים והשפעה על תאי הדם).

