נושא כרטיס זה מטופל בטופסיטיניב תרו

שם המטופל:

שם הרופא:

מספר הטלפון של הרופא:

תאריך התחלת הטיפול בטופסיטיניב תרו:

כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב על טופסיטיניב תרו.
אם המידע אינו ברור לך, אנא פנה לרופא או לרוקח כדי שיסבירו לך. יש לשמור את הכרטיס ולהציג אותו לכל רופא או רוקח המעורבים בטיפול שלך.
אם אתה מפסיק ליטול טופסיטיניב תרו, שמור את הכרטיס למשך חודשיים לפחות לאחר נטילת המנה האחרונה של טופסיטיניב תרו.
למידע נוסף יש לקרוא את העלון לצרכן. יש להשתמש בטופסיטיניב תרו בהתאם לעלון לצרכן.

דווח לרופא או לרוקח על כל התרופות שאתה נוטל, כולל תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, ויטמינים ותוספי תזונה צמחיים. נטילת טופסיטיניב תרו יחד עם תרופות מסוימות אחרות עלולה להגדיל את הסיכון לתופעות לוואי, לדיכוי מערכת החיסון ולזיהומים.
הטיפול בטופסיטיניב תרו עלול להגדיל את הסיכון לזיהומים ולממאירויות (כולל סרטן ריאות, לימפומה וסרטן עור שאינו מלנומה).

מטופלים בני 65 ומעלה עלולים להיות בסיכון גבוה לזיהומים, התקף לב ולסוגים מסוימים של סרטן.
ייתכן שהרופא יחליט שטופסיטיניב תרו לא מתאים לך.

פנה **מייד** לרופא אם אתה:

- מפתח קוצר נשימה פתאומי או קשיי נשימה, כאבים בחזה או בגב העליון, נפיחות ברגל או בזרוע, כאב או רגישות ברגל, או אדמומיות או שינוי צבע ברגל או בזרוע בזמן נטילת טופסיטיניב תרו, מאחר שאלה עשויים להיות סימנים של קריש בריאות או בווריד.
- מפתח תסמינים של זיהום כמו חום, שיעול מתמשך, ירידה במשקל או עייפות יתר.
- מפתח תסמינים של שלבקת חוגרת (הרפס זוסטר), כמו שלפוחיות או פריחה כואבת על העור.
- היית במגע קרוב עם אדם החולה בשחפת.
- מפתח כאבים עזים או לחץ בחזה (שעלולים להתפשט לזרועות, ללסת, לצוואר, לגב), קוצר נשימה, זיעה קרה, תחושה שאתה עומד להתעלף או סחרחורת פתאומית מאחר שאלו עלולים להיות סימנים של התקף לב.
- מפתח נפיחות של בלוטות הלימפה בצוואר, בבית השחי או במפשעה, מרגיש עייף באופן קבוע, מפתח חום, מזיע בלילה, יש לך שיעול מתמשך או שהוא מחמיר, מפתח קשיי נשימה, צרידות או צפצופים, או ירידה לא מוסברת במשקל.
- מבחין בגידול חדש על העור או בכל שינוי בשומות או נקודות קיימות.
- מפתח תסמינים של מחלת ריאה אינטרסטיציאלית (interstitial lung disease) כמו קוצר נשימה.
- מפתח סימנים ותסמינים בטניים כמו כאבים בקיבה, כאבי בטן, דם בצואה, או כל שינוי בהרגלי היציאות המלווה בחום.
- מפתח עור צהוב, בחילות או הקאות.
- מתכנן לקבל חיסון כלשהו. ישנם סוגים מסוימים של חיסונים שאסור לקבל במהלך הטיפול בטופסיטיניב תרו.
- את נכנסת להיריון או שמתכננת להיכנס להיריון.

אין להשתמש בטופסיטיניב תרו במהלך ההיריון. נשים בגיל הפוריות צריכות להשתמש באמצעי מניעה יעילים במהלך הטיפול בטופסיטיניב תרו ולפחות במשך 4 שבועות לאחר המנה האחרונה.
אין להניק במהלך הטיפול בטופסיטיניב תרו.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות הפורטל לדיווח תופעות לוואי אשר נמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות: www.health.gov.il או על ידי כניסה לקישור:
https://sideeffects.health.gov.il
ניתן לדווח על תופעות לוואי גם לחברת תרו במייל: drug.safety@sunpharma.com

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה כרטיס זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
למידע נוסף על התכשיר ולכרטיסים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית סירקו את הקוד הבא.

לקבלת עותק קשיח של הכרטיס באנגלית יש לפנות לחברת תרו:

טלפון: 04-8475700 דוא"ל: info@sunpharma.com

כרטיס זה אושר בהתאם להוראות משרד הבריאות באפריל 2025.

כרטיס מידע בטיחותי
למטופל בטופסיטיניב תרו
(טופסיטיניב 5 מ"ג, 10 מ"ג)