نشرة المستهلك بموجب أنظمة الصيدلة
1986 – (مستخدمات)

بسوق الدواء بموجب وصفة طبية فقط

كيتاكيبس™ TM نيو 0.25 ملغ
أقراص

كيتاكيبس™ TM نيو 0.5 ملغ
أقراص

كيتاكيبس™ TM نيو 1 ملغ
أقراص

يحتوي كل قرص على:

Alprazolam 0.25 mg	ألبرازولام 0.25 ملغ
Alprazolam 0.5 mg	ألبرازولام 0.5 ملغ
Alprazolam 1 mg	ألبرازولام 1 ملغ

"معلومات إضافية" وفي الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال للدواء: تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

- كتب تعليمي أو عائد من اكتئاب، تقلب المزاج، أفكار انتحارية أو تصرفات انتحارية.
- كتب تعليمي من مشاكل في الكبد أو في الكلى.
- كتب تعليمي من مرض رئوي أو من مشاكل تنفسية.
- كتب حالات أو تخطيطي للحمل (أنظري في السياق "الحمل والإرضاع").
- كتب مرضعة أو تخطيطي للإرضاع (أنظري في السياق "الحمل والإرضاع").
- كتب تعاني أو عانيت في الماضي من إساءة استعمال أو الاعتماد بالكحول، بادئة تصرف بوصفة طبية أو بالمخدرات.

الاختين

يقلل الاختين من تركيز الدواء في الجسم مقارنة بغير المدخنين.

الدواء

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة المستحضرات ذات المفعول الأفيوني، أدوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول، قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم، صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي)، سُبات ووفاة.

مقدمة لنشرة المستهلة بالنسبة للـ بنزوديازيبينات

تذكر هذا الدواء إلى فصيلة البنزوديازيبينات، والتي تتميز بصفات خاصة تذكر الحذر الشديد عند استعمالها.

- هنالك أهمية كبيرة بإجراء مراقبة طبية حثيثة عند تناول هذا الدواء.
- عند تناول الطبيب لهذا الدواء، أحرص على مراجعة الطبيب بعد 2-4 أسابيع، نظرًا لأن العلاج مخصص لفترات زمنية قصيرة فقط.
- إن الإستعمال المطوّل يمكن أن يؤدي إلى تناقص فعالية الدواء.
- إن الإستعمال المطوّل قد يؤدي إلى حدوث عرض شديد للتعافي، حيث يجب فيها على الدواء، توخي الحذر الشديد عند التوقف عن تناول هذا الدواء. إن التعافي يختلف عن الإدمان على الدواء، توجه إلى طبيبك ليوضح لك الإختلافات.
- إن التوقف غير المراقب عن العلاج قد يترافق بأعراض الفطام، مثل: توتر، عصبية، إرتيال، إرتجافات، أرق، ألم في المعِدَة، تقيؤات، غثيان، تعرق، تشنجات، تقلصات وألم عضلية.
- في بعض الأحيان، قد يؤدي الإستعمال المطوّل لهذا الدواء إلى تغيرات في أنماط السلوك وإلى أفكار مزعجة.
- يوصى بالسكون خلال، الحذر أثناء المشي، نظرًا لأن هذا الدواء يضعف من الرقابة الحسية وردات الفعل الجسدية.
- إن تناول الدواء من فصيلة البنزوديازيبينات سوية مع أدوية من فصيلة الأفيونات، كحول والدواء آخر من فصيلة مثبطات الجهاز العصبي المركزي يمكن أن تؤدي إلى موت، تثبيط تنفسي، سُبات (coma) لا بل الوفاة. يجب التأكد من تناقي مساعدة طبية فورية إذا كنت تعاني من إحدى هذه الأعراض:
  - تنفس سطحي أو بطيء
  - توقف التنفس، الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف عمل القلب
  - لا يجوز أستعمال كحول والدواء آخر من فصيلة المنبهات سوية مع أدوية أخرى أو أدوية أستعمال ماكنات وأجهزة، قبل أن تتم كفاية تأثير هذا الدواء.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

كيتاكيبس نيو مخصص لعلاج القلق المترافق بأكتئاب. علاج حالات الهلع المترافقة أو غير المترافقة بالرهاب.

الفصيلة العلاجية: من البنزوديازيبينات.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساسًا (أرجي) للمادة الفعالة ألبرازولام، لـ بنزوديازيبينات أخرى أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. لقائمة المركبات غير الفعالة، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية".
- كنت تتناول أدوية لعلاج التلوثات الفطرية، بما في ذلك كيتوكونازول وإيتراكونازول.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل تناول كيتاكيبس نيو، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت من إكتئاب، تقلب المزاج، أفكار إنتحارية أو تصرفات إنتحارية.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى.
- كنت تعاني من مرض رئوي أو من مشاكل تنفسية.
- كنت حاملاً أو تخطيطي للحمل (أنظري في السياق "الحمل والإرضاع").
- كنت مرضعة أو تخطيطي للإرضاع (أنظري في السياق "الحمل والإرضاع").
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من إساءة إستعمال أو التعلق بالكحول، بادئة تصرف بوصفة طبية أو بالمخدرات.

الاختين

يقلل التدخين من تركيز الدواء في الجسم مقارنة بغير المدخنين.

الدواء

إن تناول هذا الدواء مع أدوية من فصيلة المستحضرات ذات المفعول الأفيوني، أدوية أخرى مثبطة للجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك المخدرات) أو الكحول، قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم، صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي)، سُبات ووفاة.

مقدمة لنشرة المستهلة بالنسبة للـ بنزوديازيبينات

تذكر هذا الدواء إلى فصيلة البنزوديازيبينات، والتي تتميز بصفات خاصة تذكر الحذر الشديد عند استعمالها.

- هنالك أهمية كبيرة بإجراء مراقبة طبية حثيثة عند تناول هذا الدواء.
- عند تناول الطبيب لهذا الدواء، أحرص على مراجعة الطبيب بعد 2-4 أسابيع، نظرًا لأن العلاج مخصص لفترات زمنية قصيرة فقط.
- إن الإستعمال المطوّل قد يؤدي إلى حدوث عرض شديد للتعافي، حيث يجب فيها على الدواء، توخي الحذر الشديد عند التوقف عن تناول هذا الدواء. إن التعافي يختلف عن الإدمان على الدواء، توجه إلى طبيبك ليوضح لك الإختلافات.
- إن التوقف غير المراقب عن العلاج قد يترافق بأعراض الفطام، مثل: توتر، عصبية، إرتيال، إرتجافات، أرق، ألم في المعِدَة، تقيؤات، غثيان، تعرق، تشنجات، تقلصات وألم عضلية.
- في بعض الأحيان، قد يؤدي الإستعمال المطوّل لهذا الدواء إلى تغيرات في أنماط السلوك وإلى أفكار مزعجة.
- يوصى بالسكون خلال، الحذر أثناء المشي، نظرًا لأن هذا الدواء يضعف من الرقابة الحسية وردات الفعل الجسدية.
- إن تناول الدواء من فصيلة المنبِّهات سوية مع أدوية من فصيلة الأفيونات، كحول وأدوية أخرى من فصيلة مثبطات الجهاز العصبي المركزي يمكن أن تؤدي إلى موت، تثبيط تنفسي، سُبات (coma) لا بل الوفاة. يجب التأكد من تلقي مساعدة طبية فورية إذا كنت تعاني من إحدى هذه الأعراض:
  - تنفس سطحي أو بطيء
  - توقف التنفس، الذي يمكن أن يؤدي إلى توقف عمل القلب
  - لا يجوز إستعمال كحول والدواء آخر من فصيلة المنبِّهات سوية مع أدوية أخرى أو أدوية أستعمال ماكنات وأجهزة، قبل أن تتم كفاية تأثير هذا الدواء بكفاية تامة.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبَل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

لدى الكبار: يبدأ العلاج عادة بتناول قرص واحد من عيار 0.25 ملغ أو قرص واحد من عيار 0.5 ملغ 3 مرات في اليوم. لذلك، فإن المقدار الدوائي هذا تدريجيًا يشمل 0.75 ملغ حتى 1.5 ملغ. يمكن رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام) حتى الحصول (بالإمكان رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام) حتى الحصول لمقدار دوائي يومي كلي قدره 3 ملغ، المقسّم على مدار اليوم. بالإمكان رفع المقدار الدوائي الحصول على التأثير العلاجي الأقصى، بفاصل زمنية ذات 3 إلى 4 أيام، حتى مقدار دوائي يومي أقصى قدره 4 ملغ، يتم إعطاؤه بمقادير دوائية مقسمة.

الأطفال والمراهقون

كيتاكيبس نيو غير مخصص لإستعمال الأطفال والمراهقين دون عمر 18 سنة، لنقص المعلومات بخصوص سلامة وفحايلة إستعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمراهقين.

الإستعمال لدى المسنين

إن المرضى المسنين لديهم حساسية عامة للأدوية المحايثة المتعلقة بالمقدار الدوائي أثناء تناول كيتاكيبس نيو.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

- مستحضرات ذات مفعول أفيوني، لأن الإعطاء المشترك مع كيتاكيبس نيو قد يزيد من خطورة حدوث تثبيط تنفسي (أنظر في بداية هذه النشرة "ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي يتوجب عليّ معرفتها بخصوص الدواء؟").
- أدوية مضادة للفطريات (على سبيل المثال، كيتوكونازول، إيتراكونازول) (أنظر في بداية هذه الفقرة "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:").
- أدوية لعلاج القلق أو الكتئاب (على سبيل المثال، نيفازودون، فلوفوكسامين، فلوأكسيتين، باروكسيتين، سيرترالين).
- مسكن الألم المخدر بيروبوكسيفين.
- أقراص منع الحمل.
- أدوية لعلاج الصرع (على سبيل المثال، كاربامازيبين).
- أدوية مضادة للذهان المستعملة لعلاج أمراض نفسية مثل إنفصام الشخصية.
- مضادات حموضة معدية من فصيلة الماكروليدات (على سبيل المثال، إريثروميسين، كلاريثروميسين).

الكحول

لا يجوز شرب الكحول أو تناول أدوية أخرى التي قد تسبب لك ميل للنوم أو دوار أثناء تناول كيتاكيبس نيو، دون إستشارة طبيبك. عند تناول كيتاكيبس نيو سوية مع الكحول أو مع أدوية التي تسبب الميل للنوم أو الدوار، فإن كيتاكيبس نيو قد يقاقم الميل للنوم أو الدوار لديك.

الحمل والإرضاع

إذهبي طبيبك بشكل عاجل إذا كنت حاملاً أو إستشيري به إذا كنت تخططين للحمل (بالرضاع). تحدثي مع طبيبك التقريبي فيما إذا كان عليك تناول كيتاكيبس نيو أثناء الحمل.

إن تناول كيتاكيبس نيو في مرحلة متقدمة من الحمل يمكن أن يسبب لرضيعك أعراض الشباب الطفيفة مثل مشاكل في التنفس، تقلل، توتر عضلي منخفض. إذا تناولت كيتاكيبس نيو لفترة طويلة في المرحلة الأخيرة لحملك أو إذا تناولت جرعة عالية، فإن المولود الجديد قد يعاني من أعراض الإنسحاب مثل إنخفاض حرارة الجسم، تشنجات، توتر عضلي، إرتجافات، إضطرابات في التغذية، نعاس، صعوبات في التنفس، إسهال أو قيء. إذا ولد طفلك بعد تناولك لكيتاكيبس نيو، فإن الأعراض قد تظهر على طفلك. إذا ظهرت أعراض على طفلك، فإن عليك الإتصال بالطبيب.

لا يجوز الإرضاع أثناء تناول كيتاكيبس نيو. إن كيتاكيبس نيو يمر إلى حليب الثدي. لذلك، فإن الإرضاع أثناء تناول كيتاكيبس نيو قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم أو صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي).

السياقة وإستعمال الماكنات

قد يسبب لك كيتاكيبس نيو الشعور بنعاس أو دوار وبالتالي من الخطورة، إلى أن تتأكد كيفية تأثير كيتاكيبس نيو عليك.

يجوز كيتاكيبس نيو على الكثير موظفيات، الذي يعتبر نوعًا من السكر. إذا قيل لك من قِبَل طبيبك بأن لديك عدم تحمل سكريات معينة، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على 0.15 ملغ بنزوات الصوديوم في كل قرص. قد يقاقم بنزوات الصوديوم من اليرقان (إصفرار الجلد والعينين) لدى حديثي الولادة (بإعمار حتى 4 أسابيع).

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص ولذلك يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبَل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

لدى الكبار: يبدأ العلاج عادة بتناول قرص واحد من عيار 0.25 ملغ أو قرص واحد من عيار 0.5 ملغ 3 مرات في اليوم. لذلك، فإن المقدار الدوائي هذا تدريجيًا يشمل 0.75 ملغ حتى 1.5 ملغ. يمكن رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام) حتى الحصول (بالإمكان رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام) حتى الحصول لمقدار دوائي يومي كلي قدره 3 ملغ، المقسّم على مدار اليوم. بالإمكان رفع المقدار الدوائي الحصول على التأثير العلاجي الأقصى، بفاصل زمنية ذات 3 إلى 4 أيام، حتى مقدار دوائي يومي أقصى قدره 4 ملغ، يتم إعطاؤه بمقادير دوائية مقسمة.

القلق: يبدأ العلاج عادة بتناول قرص واحد من عيار 0.25 ملغ أو قرص واحد من عيار 0.5 ملغ 3 مرات في اليوم. لذلك، فإن المقدار الدوائي هذا تدريجيًا يشمل 0.75 ملغ حتى 1.5 ملغ. يمكن رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام) حتى الحصول لمقدار دوائي يومي كلي قدره 3 ملغ، المقسّم على مدار اليوم. بالإمكان رفع المقدار الدوائي الحصول على التأثير العلاجي الأقصى، بفاصل زمنية ذات 3 إلى 4 أيام، حتى مقدار دوائي يومي أقصى قدره 4 ملغ، يتم إعطاؤه بمقادير دوائية مقسمة.

الإستعمال الدواء والمطعام

قد يرفع عصير الجريب فروت من تركيز كيتاكيبس نيو في الدم.

الإستعمال الدواء والكحول

لا يجوز شرب الكحول أو تناول أدوية أخرى التي قد تسبب لك ميل للنوم أو دوار أثناء تناول كيتاكيبس نيو، دون إستشارة طبيبك. عند تناول كيتاكيبس نيو سوية مع الكحول أو مع أدوية التي تسبب الميل للنوم أو الدوار، فإن كيتاكيبس نيو قد يقاقم الميل للنوم أو الدوار لديك.

الحمل والإرضاع

إذهبي طبيبك بشكل عاجل إذا كنت حاملاً أو إستشيري به إذا كنت تخططين للحمل (بالرضاع). تحدثي مع طبيبك التقريبي فيما إذا كان عليك تناول كيتاكيبس نيو أثناء الحمل.

إن تناول كيتاكيبس نيو في مرحلة متقدمة من الحمل يمكن أن يسبب لرضيعك أعراض الشباب الطفيفة مثل مشاكل في التنفس، تقلل، توتر عضلي منخفض. إذا تناولت كيتاكيبس نيو لفترة طويلة في المرحلة الأخيرة لحملك أو إذا تناولت جرعة عالية، فإن المولود الجديد قد يعاني من أعراض الإنسحاب مثل إنخفاض حرارة الجسم، تشنجات، توتر عضلي، إرتجافات، إضطرابات في التغذية، نعاس، صعوبات في التنفس، إسهال أو قيء. إذا ولد طفلك بعد تناولك لكيتاكيبس نيو، فإن الأعراض قد تظهر على طفلك. إذا ظهرت أعراض على طفلك، فإن عليك الإتصال بالطبيب.

لا يجوز الإرضاع أثناء تناول كيتاكيبس نيو. إن كيتاكيبس نيو يمر إلى حليب الثدي. لذلك، فإن الإرضاع أثناء تناول كيتاكيبس نيو قد يؤدي إلى الشعور بميل شديد للنوم أو صعوبات في التنفس (تثبيط تنفسي).

السياقة وإستعمال الماكنات

قد يسبب لك كيتاكيبس نيو الشعور بنعاس أو دوار وبالتالي من الخطورة، إلى أن تتأكد كيفية تأثير كيتاكيبس نيو عليك.

يجوز كيتاكيبس نيو على الكثير موظفيات، الذي يعتبر نوعًا من السكر. إذا قيل لك من قِبَل طبيبك بأن لديك عدم تحمل سكريات معينة، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي هذا الدواء على 0.15 ملغ بنزوات الصوديوم في كل قرص. قد يقاقم بنزوات الصوديوم من اليرقان (إصفرار الجلد والعينين) لدى حديثي الولادة (بإعمار حتى 4 أسابيع).

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم في القرص ولذلك يعتبر "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبَل الطبيب فقط.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو عادة:

لدى الكبار: يبدأ العلاج عادة بتناول قرص واحد من عيار 0.25 ملغ أو قرص واحد من عيار 0.5 ملغ 3 مرات في اليوم. لذلك، فإن المقدار الدوائي هذا تدريجيًا يشمل 0.75 ملغ حتى 1.5 ملغ. يمكن

PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS (PREPARATIONS) – 1986

This medicine is dispensed with a doctor's prescription only

Xanagis® New 0.25 mg Tablets

Xanagis® New 0.5 mg Tablets

Xanagis® New 1 mg Tablets

Each tablet contains:
Alprazolam 0.25 mg
Alprazolam 0.5 mg
Alprazolam 1 mg

For the list of inactive ingredients and allergens in the preparation: See in section 6 "Additional information" and in section 2 "Important information about some of the ingredients of the medicine".

Read the entire leaflet carefully before using the medicine. This leaflet contains concise information about the medicine. If you have any further questions, refer to the doctor or pharmacist.
This medicine has been prescribed for the treatment of your illness. Do not pass it on to others. It might harm them, even if it seems to you that their medical condition is similar.

What is the most important information I need to know about the medicine?

Taking this medicine with medicines from the opioid family, other central nervous system depressants (including drugs) or alcohol may cause a sense of deep drowsiness, breathing difficulty (respiratory depression), coma and death.

Introduction to the benzodiazepine patient leaflet
This medicine belongs to the benzodiazepine group, which has special characteristics necessitating great caution with its use.
- Close medical monitoring is very important when taking this medicine.
- When you take this medicine, be sure to refer to the doctor after 2-4 weeks, as the treatment is meant for short periods only.
- Prolonged use of this medicine may cause the medicine's effect to decrease.
- Prolonged use may cause severe dependence, which will make it difficult for the patient to stop taking this medicine. Dependence is different from addiction to the medicine; refer to your doctor for an explanation of the differences.
- Uncontrolled discontinuation of treatment may be accompanied by withdrawal symptoms, such as: tension, nervousness, confusion, tremor, insomnia, abdominal pain, vomiting, nausea, sweating, spasms, muscle cramps and pain.
- Sometimes, prolonged use of this medicine may cause changes in behavior patterns and obsessive thoughts.
- Especially with the elderly, it is recommended to be careful when walking because this medicine impairs alertness and sometimes motor coordination and therefore, there is a risk of tripping or falling.
- **Taking medications from the benzodiazepine family together with medications from the opioids family, alcohol and other medications from the central nervous system depressant family can cause increased drowsiness, respiratory depression, coma and even death. Refer for medical assistance immediately if you suffer from any of the following:**
  ➢ shallow or slow breathing
  ➢ breathing cessation, which can lead to the heart stopping
  ➢ excessive sleepiness (sedation)

Do not use Xanagis New together with opioid preparations when driving or when operating machinery and equipment until you know how the medicine combination affects you.

1. WHAT IS THE MEDICINE INTENDED FOR?

Xanagis New is intended for treatment of anxiety accompanied by depression. Treatment of panic states with or without accompanying phobia.

Therapeutic group: Benzodiazepines.

2. BEFORE USING THE MEDICINE

Do not use the medicine if:
- you are hypersensitive (allergic) to the active ingredient alprazolam, to other benzodiazepines or to any of the additional ingredients contained in the medicine. For the list of inactive ingredients, see section 6 "Additional information".
- you are taking medicines to treat fungal infections, including ketoconazole and itraconazole.

Special warnings regarding use of the medicine
Before taking Xanagis New, tell the doctor if:
- you suffer or have suffered from depression, mood changes, suicidal thoughts or suicidal behavior.
- you suffer from liver or kidney problems.
- you suffer from a lung disease or breathing problems.
- you are pregnant or are planning a pregnancy (see below "Pregnancy and breastfeeding").
- you are breastfeeding or are planning to breastfeed (see below "Pregnancy and breastfeeding").
- you suffer or have suffered in the past from abuse of or dependence on alcohol, prescription medicines or drugs.

Smoking
Smoking reduces the medicine's concentration in the body in comparison to non-smokers.

Children and adolescents
Xanagis New is not intended for use in children and adolescents under 18 years of age, as there is no information regarding the safety and effectiveness of the use of this medicine in children and adolescents.

Use in the elderly
Elderly patients are especially susceptible to dosage-related side effects while using Xanagis New.

Drug interactions
If you are taking, or have recently taken, other medicines, including non-prescription medicines and nutritional supplements, tell the doctor or pharmacist.
Especially if you are taking:
- opioids, as concomitant use with Xanagis New may increase the risk of respiratory depression (see at the beginning of this leaflet "What is the most important information I need to know about the medicine?").
- antifungal medicines (e.g., ketoconazole, itraconazole) (see at the beginning of this section "Do not use the medicine if:").
- medicines to treat anxiety or depression (e.g., nefazodone, fluvoxamine, fluoxetine, paroxetine, sertraline).
- the narcotic analgesic propoxyphene.
- contraceptive pills.
- medicines to treat epilepsy (e.g., carbamazepine).
- antipsychotic medicines used to treat mental illnesses such as schizophrenia.
- antihistamines used to relieve allergies.
- certain antibiotics of the macrolide family (e.g., erythromycin, clarithromycin).
- isoniazid (to treat tuberculosis).
- cimetidine (to treat stomach ulcers).
- tricyclic antidepressants (e.g., imipramine, desipramine).
- calcium channel blockers (e.g., diltiazem, nicardipine, nifedipine).
- cyclosporine.
- ergotamine (to prevent and treat migraine).
- amiodarone (to treat arrhythmia).
- drugs or additional medicines that cause drowsiness or dizziness. Xanagis New may make the drowsiness or dizziness worse, when taken with drugs or medicines that cause drowsiness or dizziness.

Use of the medicine and food
Grapefruit juice may increase the concentration of Xanagis New in the blood.

Use of the medicine and alcohol consumption
Do not drink alcohol or take other medicines that may cause you drowsiness or dizziness while taking Xanagis New, without consulting your doctor. When Xanagis New is taken together with alcohol or medicines that cause drowsiness or dizziness, Xanagis New may make your drowsiness or dizziness worse.

Pregnancy and breastfeeding
Pregnancy
Inform your doctor urgently if you are pregnant or consult with him/her if you are planning a pregnancy while you are being treated with Xanagis New, as Xanagis New may harm your fetus. Your doctor must decide if you should take Xanagis New while pregnant. Taking Xanagis New at a later stage of pregnancy can cause your baby to have symptoms of mild anesthesia, such as breathing problems, sluggishness, low muscle tone.
Breastfeeding
Consult your doctor if you are breastfeeding or are planning to breastfeed. Do not breastfeed while taking Xanagis New, as Xanagis New passes into your breast milk and may harm your baby. Talk to your doctor about the best way to feed your baby if you are taking Xanagis New.

Driving and use of machinery
Xanagis New may cause you to be sleepy or dizzy and slow your thinking and motor skills. Do not drive, operate dangerous machinery or engage in dangerous activities until you know how Xanagis New affects you.

Important information about some of the ingredients of the medicine
Xanagis New contains lactose monohydrate, which is a type of sugar. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to certain sugars, contact your doctor before taking this medicine.
This medicine contains 0.15 mg sodium benzoate in each tablet. Sodium benzoate may make jaundice (yellowing of the skin and eyes) worse in newborns (up to 4 weeks old).
This medicine contains less than 23 mg sodium per tablet, that is to say, it is essentially "sodium-free".

3. HOW SHOULD YOU USE THE MEDICINE?

Always use the preparation according to the doctor's instructions. Check with the doctor or pharmacist if you are not sure about the dosage and treatment regimen of the preparation.
The dosage and treatment regimen will be determined by the doctor only.
The usual recommended dosage is:
In adults:
Anxiety: Usually, treatment will begin with taking one 0.25 mg tablet or one 0.5 mg tablet 3 times daily. Accordingly, the daily dosage will include 0.75 mg to 1.5 mg. This dosage can increase gradually (the dose can be increased by 1 mg every 3-4 days) up to a total daily dosage of 3 mg, spread out over the day. The dosage can be increased at intervals of 3 to 4 days to achieve a maximum therapeutic effect, to a maximum daily dosage of 4 mg, which will be given in divided doses.
Panic: Usually, the treatment will begin with taking one tablet of 0.5 mg 3 times daily. This dosage can increase gradually depending on the reaction (the dose can be increased by 1 mg every 3-4 days) to a daily dosage greater than 4 mg, spread out over the day.
When it is necessary to increase the dosage, it is customary to first increase the nighttime dosage, before increasing the daytime dosage, to ensure that you are more alert during the day. If you start to experience side effects, the doctor may reduce the dosage.
Elderly or patients suffering from a debilitating disease: The usual starting dosage is 0.25 mg two to three times daily. This dosage can be increased gradually according to the doctor's instructions, if necessary and if you do not suffer from side effects.
Do not exceed the recommended dose.

Duration of treatment
Xanagis New is intended for short-term treatment (no more than 8-12 weeks). The doctor will usually evaluate your condition at the very latest at the end of 4 weeks and decide if it necessary to continue treatment.
In certain cases, in accordance with a specialist's assessment, it may be necessary to extend the treatment beyond the maximum treatment period.
Reduced effect of the medicine may develop if it is used for more than several weeks.

Method of administration
There is no information about crushing/halving/chewing.
To ease swallowing, the tablet can be halved for immediate use, if necessary. Swallow the two halves together immediately after halving.

If you have accidentally taken a higher dosage, you may suffer from drowsiness, confusion, impaired coordination, reduced reflexes and coma. Death has also been reported.
If you have taken an overdose or if a child or anyone else has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to the doctor or to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

If you forgot to take this medicine at the designated time, do not take a double dose. Take the next dose at the scheduled time and consult the doctor.
Do not increase the dosage without consulting the doctor, even if you think that you are not responding to the medicine. Medicines of the benzodiazepine group may cause emotional or physical dependence, even if they were recommended for your use.

If you stop taking the medicine
- Even if there is an improvement in your health, do not stop treatment with the medicine without consulting the doctor, as the dosage must be decreased gradually.
- **Physical dependence and withdrawal reactions.** Xanagis New can cause physical dependence and withdrawal reactions.
- If you stop taking the tablets abruptly (and not gradually), you may suffer from serious and life-threatening side effects, including abnormal movements, responses or expressions, seizures, severe mental or nervous system changes, depression, seeing or hearing things that others do not see or hear, an extreme increase in activity or talking, losing touch with reality and suicidal thoughts or actions. **Contact your doctor or proceed to the nearest hospital emergency room immediately if you suffer from any of these symptoms**.
- Some patients who suddenly (not gradually) stop taking benzodiazepines may suffer from side effects that can last for several weeks to more than 12 months, including anxiety, trouble remembering, learning or concentrating, depression, sleeping problems, feeling like insects are crawling under the skin, weakness, shaking, muscle cramps, burning or prickling feeling in the hands, arms, and legs, ringing in the ears.
- In addition, you may suffer from withdrawal symptoms (see section 4 "Side effects").

Adhere to the treatment regimen as recommended by the doctor.
Do not take medicines in the dark! Check the label and the dose each time you take a medicine. Wear glasses if you need them.
If you have further questions regarding use of the medicine, consult the doctor or pharmacist.

4. SIDE EFFECTS

As with any medicine, the use of Xanagis New may cause side effects in some users. Do not be alarmed while reading the list of side effects. You might not suffer from any of them.
Side effects with Xanagis New, if they occur, are usually seen at the beginning of the treatment and usually disappear with continued medication.

Xanagis New may cause serious side effects, which include (see at the beginning of this leaflet "What is the most important information I need to know about the medicine?"):
- **Risk of abuse, misuse and addiction.** There is a risk of abuse, misuse and addiction with benzodiazepines, including Xanagis New, which can lead to overdose and serious side effects including coma and death.
- **Serious side effects including coma and death have occurred in people who have abused or misused benzodiazepines including Xanagis New**. These serious side effects may also include hallucinations, paranoia, suicidal thoughts or actions, seizures and difficulty breathing. **Contact your doctor or proceed to the nearest hospital emergency room immediately if you suffer from any of these serious side effects.**
- **Use of Xanagis New can cause sleepiness, dizziness and slowed thinking and motor activity**.
- **You may develop an addiction even if you take Xanagis New according to the doctor's instructions.**
- **Seizures.** Discontinuing Xanagis New can cause seizures and seizures that will not stop (status epilepticus).
- **Mania.** Xanagis New may cause increased activity and speech (hypomania and mania) in people suffering from depression.

Seek emergency medical assistance immediately in the following cases:
- Slowed breathing or shallow breathing
- Respiratory arrest (may lead to cardiac arrest)
- Excessive sleepiness

The most common side effects of Xanagis New include drowsiness and lightheadedness.

Additional Side Effects:
Very common side effects (may affect more than 1 out of 10 users):
Drowsiness, lightheadedness, depression, headache, dry mouth, constipation, diarrhea, fatigue and tiredness, decreased blood pressure, coordination problems, nervousness, memory impairment, dizziness, insomnia, cognitive disorder, speech disorder (dysarthria), anxiety, abnormal involuntary movements, changes in libido, confusion, decreased salivation, nausea, vomiting, abdominal discomfort, nasal congestion, rapid heart rate (tachycardia), chest pain, blurred vision, sweating, rash, increased appetite, decreased appetite, weight gain, weight loss, difficulty urinating, menstrual irregularities.
Common side effects (may affect up to 1 user out of 10):
Confusion, insomnia, irritability, fainting, dizziness, physical restlessness (akathisia), nausea, vomiting, increased salivation, rapid heart rate (tachycardia), palpitations, blurred vision, stiffness, tremor, dermatitis, allergy, nasal congestion, weight gain, weight loss, muscle spasm, increase in libido, change in libido (non-specific), weakness, muscle tone disorders, restlessness (agitation), disinhibition, paresthesia, talkativeness, vasomotor disorders, derealization, abnormal dreams, fear, feeling warm, hyperventilation, upper respiratory tract infection, tinnitus (noises in the ears), muscle cramps, muscle stiffness, sexual dysfunctions, edema, urinary incontinence, infection.

If a side effect occurs, if one of the side effects worsens, or if you suffer from a side effect not mentioned in the leaflet, consult the doctor.

Reporting of side effects
Side effects can be reported to the Ministry of Health by clicking on the link "Report Side Effects of Drug Treatment" found on the Ministry of Health homepage (www.health.gov.il) that directs you to the online form for reporting side effects, or by entering the link: https://sideeffects.health.gov.il
In addition, you can report to Padagis through the following address: Padagis.co.il

5. HOW SHOULD THE MEDICINE BE STORED?

- Avoid poisoning! This medicine, and all other medicines, must be stored in a closed place out of the reach and sight of children and/or infants to avoid poisoning. Do not induce vomiting without an explicit instruction from the doctor.
- Do not use the medicine after the expiry date (exp. date) that appears on the carton package and the blister it contains. The expiry date refers to the last day of that month.
- Store below 25°C.

6. ADDITIONAL INFORMATION

- In addition to the active ingredient, the medicine also contains the following inactive ingredients:
  Xanagis New 0.25 mg:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, Silica colloidal anhydrous, Quinoline yellow aluminum lake, Sodium benzoate
  Xanagis New 0.5 mg:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, Silica colloidal anhydrous, FD&C Yellow No.6 aluminum lake, Sodium benzoate, Ponceau 4 R red lake
  Xanagis New 1 mg:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, FD&C Blue No.2 aluminum lake, Silica colloidal anhydrous, Sodium benzoate, Carmoisine aluminum lake
- What the medicine looks like and contents of the package:
  The medicine is supplied in a carton package containing 50 tablets in blisters (trays). Each blister contains 10 tablets.
  Xanagis New 0.25 mg: A round, yellow, biconvex tablet with a score line on one side.
  Xanagis New 0.5 mg: A round, orange, biconvex tablet with a score line on one side.
  Xanagis New 1 mg: A round, blue, biconvex tablet with a score line on one side.
- Registration holder and importer: Padagis Israel Agencies Ltd., 1 Rakefet St., Shoham.
- Revised in March 2026
- Registration numbers of the medicine in the National Drug Registry of the Ministry of Health:
  Xanagis New 0.25 mg: 181-81-38296-99
  Xanagis New 0.5 mg: 181-82-38297-99
  Xanagis New 1 mg: 181-83-38298-99

03/2026 SH115766 PL v2

الهلع: يبدأ العلاج عادة بتناول قرص واحد من عيار 0.5 ملغ 3 مرات في اليوم. يمكن رفع المقدار الدوائي هذا تدريجيًا كأمر متعلق بإستجابتك (بالإمكان رفع المقدار الدوائي بـ 1 ملغ كل 3-4 أيام)، حتى الوصول لمقدار دوائي يومي أكبر من 4 ملغ، مقسّم على مدار اليوم.
عند الحاجة لرفع المقدار الدوائي، من المعتاد بداية رفع المقدار الدوائي المتناول في ساعات الليل، قبل رفع المقدار الدوائي المتناول في ساعات اليوم، وذلك للتأكد من كونك أكثر يقظة خلال اليوم. إذا بدأت تشعر بأعراض جانبية، فمن الجائز أن يخفض الطبيب المقدار الدوائي.
المسنون أو المتعالجون الذين يعانون من مرض يؤدي إلى الإنهاك:
إن المقدار الدوائي الإبتدائي الإعتيادي هو 0.25 ملغ مرتين حتى ثلاث مرات في اليوم. بالإمكان رفع المقدار الدوائي هذا تدريجيًا، وفق تعليمات الطبيب، إذا دعت الحاجة، وفي حال عدم معاناتك من أعراض جانبية.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج
كساناچيس نيو مخصص للعلاج قصير الأمد (ليس أكثر من 8-12 أسبوعًا). عادة، سيقوم الطبيب بتقييم حالتك عند نهاية 4 أسابيع على الأكثر وسيقرر ما إذا كان يتطلّب الأمر إستمرار العلاج.
في حالات معينة، ووفقًا لتقييم طبيب مختص قد تكون هنالك حاجة إلى إطالة فترة العلاج إلى ما يتجاوز الفترة العلاجية القصوى.
قد يقل تأثير الدواء إذا تم إستعماله لأكثر من عدة أسابيع.

طريقة التناول
لا تتوفر معلومات حول السحق/الشطر/المضغ.
من أجل تسهيل عملية البلع، بالإمكان، إذا دعت الحاجة، شطر القرص للإستعمال الفوري. يجب بلع قسميّ القرص سوية مباشرة بعد الشطر.

إذا تناولت بالخطأ مقدارًا دوائيًا أكبر، فمن الجائز أن تعاني من ميل للنوم، إرتباك، خلل في التناسق الحركي، قلة المنعكسات وسُبات (coma). بُلّغ أيضًا عن حالات وفاة.
إذا تناولت مقدارًا دوائيًا مفرطًا أو إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، فلا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف. تناول المقدار التالي في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب.
لا يجوز رفع المقدار الدوائي بدون إستشارة الطبيب، حتى وإن كنت تعتقد بأنك لا تستجيب للدواء. إن الأدوية من فصيلة البنزوديازيبينات قد تسبب تعلق إنفعالي أو بدني، حتى وإن أوصيت بإستعمالها.

إذا توقفت عن تناول الدواء
- لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية، وذلك لأنه يجب خفض المقدار الدوائي تدريجيًا.
- **التعلق البدني وردود الفعل الإنسحابية.** قد يسبب كساناچيس نيو تعلقًا بدنيًا وردود فعل إنسحابية.
- إذا توقفت عن تناول الأقراص دفعة واحدة (وليس بشكل تدريجي)، فقد تعاني من أعراض جانبية شديدة وتشكل خطرًا على الحياة بما في ذلك حركات، ردود فعل أو تعابير شاذة، إختلاجات، تغيرات خطيرة في الحالة النفسية أو في الجهاز العصبي، إكتئاب، رؤية أو سماع أشياء لا يراها أو يسمعها الآخرون، زيادة حادة في النشاط أو في الكلام، فقدان الإتصال بالواقع وأفكار أو أفعال إنتحارية. **إتصل بطبيبك أو توجه فورًا إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى إذا كنت تعاني من إحدى تلك الأعراض.**
- قد يعاني بعض المتعالجين الذين يتوقفون عن تناول البنزوديازيبينات دفعة واحدة (وليس بشكل تدريجي) من أعراض جانبية التي قد تستمر لعدة أسابيع حتى أكثر من 12 شهرًا، بما في ذلك قلق، مشاكل في الذاكرة، التعلم أو التركيز، إكتئاب، مشاكل في النوم، شعور وكأن هنالك حشرات تزحف تحت الجلد، ضعف، إرتجاف، تقلصات عضلية، شعور بحرقان أو بوخز في اليدين، في الذراعين والرجلين، طنين في الأذنين.
- بالإضافة لذلك من الجائز أن تعاني من أعراض الفطام (أنظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كساناچيس نيو قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أيًا منها.
إذا حدثت أعراض جانبية تتعلق بـ كساناچيس نيو، فإنها تُشاهَد غالبًا في بداية العلاج وتختفي عادة مع إستمرار العلاج الدوائي.

قد يسبب كساناچيس نيو أعراضًا جانبية خطيرة، التي تشمل (أنظر في بداية هذه النشرة "ما هي المعلومات الأكثر أهمية التي يتوجب عليّ معرفتها عن الدواء؟"):
- **خطورة إساءة الإستعمال، الإستعمال الخاطئ والإدمان.** هنالك خطورة لإساءة الإستعمال، لإستعمال خاطئ والإدمان عند إستعمال البنزوديازيبينات بما في ذلك كساناچيس نيو، مما قد يؤدي إلى فرط المقدار الدوائي وأعراض جانبية خطيرة بما في ذلك سُبات ووفاة.
- **حدثت أعراض جانبية خطيرة بما في ذلك سُبات ووفاة لدى الأشخاص الذين أساؤوا إستعمال البنزوديازيبينات أو إستعملوها بشكل خاطئ، بما في ذلك كساناچيس نيو.** هذه الأعراض الجانبية الخطيرة قد تشمل هلوسة، جنون العظمة، أفكار أو أفعال إنتحارية، إختلاجات وصعوبات في التنفس. **إتصل بطبيبك أو توجه إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى فورًا إذا كنت تعاني من إحدى الأعراض الجانبية الخطيرة هذه.**
- **إستعمال كساناچيس نيو يمكن أن يؤدي إلى ميل للنوم، دوار وتباطؤ في التفكير والنشاط الحركي.**
- **قد تدمن حتى لو كنت تستعمل كساناچيس نيو وفقًا لإرشادات الطبيب.**
- **إختلاجات.** قد يسبّب إيقاف كساناچيس نيو إختلاجات وإختلاجات من دون توقف (status epilepticus).
- **الهوس.** قد يسبب كساناچيس نيو زيادة في النشاط والكلام (هوسًا خفيفًا وهوس) لدى الأشخاص الذين يعانون من الإكتئاب.

توجه فورًا لتلقي مساعدة طبية طارئة في الحالات التالية:
- تباطؤ في التنفس أو تنفس سطحي
- توقف التنفس (قد يؤدي إلى توقف القلب)
- ميل مفرط للنوم

تشمل الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لـ كساناچيس نيو نعاس وشعور بالدوار.

أعراض جانبية إضافية:
أعراض جانبية شائعة جدًا (very common) (قد تؤثر على أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):
نعاس، شعور بالدوار، إكتئاب، صداع، جفاف في الفم، إمساك، إسهال، إنهاك وإرهاق، إنخفاض ضغط الدم، مشاكل في التناسق، عصبية، ضعف الذاكرة، دوار، أرق، إضطراب إدراكي، إضطراب في الكلام (dysarthria)، قلق، حركات لا إرادية شاذة، تغيرات في الرغبة الجنسية، إرتباك، إنخفاض في إفراز اللعاب، غثيان، تقيؤ، إنزعاج في البطن، إحتقان الأنف، نبض سريع (tachycardia)، آلام في الصدر، تشوش الرؤية، تعرق، طفح، زيادة الشهية للطعام، إنخفاض الشهية للطعام، زيادة في الوزن، إنخفاض في الوزن، صعوبة في التبول، إضطرابات في الدورة الشهرية.
أعراض جانبية شائعة (common) (قد تؤثر على حتى 1 بين 10 مستعملين):
إرتباك، أرق، عصبية، إغماء، دوار، عدم هدوء جسماني (akathisia)، غثيان، تقيؤ، تزايد إفراز اللعاب، نبض سريع (tachycardia)، ضربات قلب، تشوّش الرؤية، تصلب، إرتجاف، إلتهاب في الجلد، حساسية، إحتقان في الأنف، زيادة في الوزن، إنخفاض في الوزن، تشنج العضلات، زيادة في الرغبة الجنسية، تغير في الرغبة الجنسية (غير محدد)، ضعف، إضطرابات في التوتر العضلي، عدم هدوء (agitation)، إنعدام الضوابط، تنمل، ثرثرة، إضطرابات وعائية حركية، شعور غير واقعي، أحلام شاذة، خوف، الشعور بسخونة، فرط تنفس (hyperventilation)، تلوث في طرق التنفس العلوية، طنين (ضجيج في الأذنين)، تقلصات عضلية، تصلب في العضلات، إضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي، وذمة، سلس البول، تلوث.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
https://sideeffects.health.gov.il
بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة پاداچيس عن طريق تصفح الرابط:
Padagis.co.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر علبة الكرتون وعلى اللويحة (بليستر) التي بداخلها. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على المواد غير الفعالة التالية:
  كساناچيس نيو 0.25 ملغ:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, Silica colloidal anhydrous, Quinoline yellow aluminum lake, Sodium benzoate
  كساناچيس نيو 0.5 ملغ:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, Silica colloidal anhydrous, FD&C Yellow No.6 aluminum lake, Sodium benzoate, Ponceau 4 R red lake
  كساناچيس نيو 1 ملغ:
  Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Pregelatinized starch, Magnesium stearate, Docusate sodium, FD&C Blue No.2 aluminum lake, Silica colloidal anhydrous, Sodium benzoate, Carmoisine aluminum lake
- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
  يتوفر الدواء ضمن علب كرتون تحوي 50 قرصًا معبأً ضمن لويحات (بليستر). يحوي كل بليستر 10 أقراص.
  كساناچيس نيو 0.25 ملغ: قرص أصفر مستدير، محدب من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد.
  كساناچيس نيو 0.5 ملغ: قرص برتقالي مستدير، محدب من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد.
  كساناچيس نيو 1 ملغ: قرص أزرق مستدير، محدب من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد.
- صاحب الإمتياز والمستورد: وكالات پاداچيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهام.
- تم إعدادها في آذار 2026
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
  كساناچيس نيو 0.25 ملغ: 181-81-38296-99
  كساناچيس نيو 0.5 ملغ: 181-82-38297-99
  كساناچيس نيو 1 ملغ: 181-83-38298-99
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

SH115766 PL v2 03/2026